

AUGLÝSING

til lækna (dýralækna, tannlækna) og lyfsala í tilefni löggildingar
nýrrar lyfjaskrár.

Samkvæmt tilskipun nr. 86 31. ágúst 1965 um setningu nýrrar lyfjaskrár og auglýsingu nr. 145 27. ágúst 1965 um löggildingu danska lyfseðlasafnsins 1963 á Íslandi er hin danska útgáfa norrænu lyfjaskrárinnar 1963, ásamt breytingum, Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, Volumen I—IV og Addendum (N63) og danska lyfseðlasafnið 1963, Dispensatorium Danicum 1963, (DD63) gildandi hér á landi frá 1. apríl 1966.

Gildistaka þessara forskriftabóka hefur í för með sér allverulegar breytingar á þeim fyrirmælum, er gilt hafa um framleiðslu og afhendingu lyfja.

Hér á eftir fer yfirlit yfir þær helztu breytingar, er einkum varða ávisanir á lyf.

Lyf, er ekki hafa verið skráð áður, lyf með nýju nafni eða breyttum rithætti, svo og lyf, er hafa annan styrkleika eða samsetningu miðað við það, sem áður var.

Mörg ný efni, jurta- og dýralyf hafa verið skráð í N63 og margar nýjar samsetningar teknar upp í N63 og DD63. Yfirlit hér að lútandi er að finna í 1. bindi N63, bls. 53 og í DD63, bls. 9.

Nokkur efni, jurta- og dýralyf, er voru skráð í dönsku lyfjaskránni, Pharmacopoea Danica 1948 (D48), eru ekki skráð í N63, sbr. yfirlit í 1. bindi N63, bls. 58. Sams konar skrá yfir samsetningar, er skráðar voru í D48, en ekki eru skráðar í N63 eða DD63, er að finna í DD63, bls. 12.

Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar í N63 og DD63 með nýju heiti eða breyttum rithætti frá því er var í D48 (ásamt viðaukum), FK,* D.vet. 50* og DAK 50* (ásamt CMS*) er að finna í viðauka 1 hér að aftan.

Þá skal vakin athygli á því, að gerð hefur verið breyting á fyrirmælum um innihald eða samsetningu ýmisra efna, jurta- og dýralyfja og samsetninga, og vísast í því sambandi til viðauka 2 hér að aftan. Sérstök athygli skal vakin á breytingum, er gerðar hafa verið á fyrirmælum um styrkleika neðangreindra lyfja:

Fyrri styrkleiki, sbr. D48 eða DAK50	Núverandi styrkleiki sbr. N63 eða DD63
Injectabile ascorbici, innihélt 2% askorbínsýru	Injectabile ascorbicum 10%, inniheldur nú 10%
Injectabile ergometrini fortius innihélt 0,25 mg/ml af ergómetríni	Injectabile ergometrini inniheldur 0,2 mg/ml af ergómetrínmaleati
Injectabile ergometrini mite innihélt 0,1 mg/ml af ergómetríni	Injectabile ergometrini inniheldur 0,2 mg/ml af ergómetrínmaleati
Injectabile menadioni innihélt 5 mg/ml af menadionnatríumbísúlfíti	Injectabile menadioni inniheldur nú 10 mg/ml

*) Sjá skammstafanir bls. 6.

Fyrri styrkleiki, sbr. D48 eða DAK50	Núverandi styrkleiki sbr. N63 eða DD63
Injectabile noradrenalini innihélt 0,1 mg/ml af noraðrenalíni	Injectabile noradrenalini 0,1% inniheldur nú 1 mg/ml
Injectabile scopolamini innihélt 1 mg/ml af skópólamínbrómiði	Injectabile scopolamini inniheldur nú 0,3 mg/ml
Injectabile g-strophanthini innihélt 0,1 mg/ml af g-strófantini	Injectabile g-strophathini inniheldur nú 0,25 mg/ml
Ocuguttae atropini innihélt 0,5% af atrópinsúlfati	Ocuguttae atropini 1% innihalda nú 1%
Ocuguttae homatropini innihélt 0,5% af hómatrópínbrómiði	Ocuguttae homatropini 1% innihalda nú 1%
Ocuguttae physostigmini innihéldu 1% af fýsóstigmínsalísýlati	Ocuguttae physostigmini 0,5% innihalda nú 0,5%
Ocuguttae scopolamini innihéldu 0,1% af skópólamínbrómiði	Ocuguttae scopolamini 0,2% innihalda nú 0,2%
Tablettaa carbacholini innihéldu 1 mg af karbakólinklóríði í töflu	Tablettaa carbacholini 2 mg innihalda nú 2 mg
Tablettaa chinidini innihéldu 0,1 g af kínidínsúlfati í töflu	Tablettaa chinidini 0,2 g innihalda nú 0,2 g og eru jafnframt sykurhúðaðar
Tablettaa digitalis innihéldu 100 mg af kvörðuðum digitalisblöðum í töflu	Tablettaa digitalis 50 mg innihalda nú 50 mg og eru jafnframt litarhúðaðar
Tablettaa hypnopheni (DAK50) innihéldu 100 mg af allýprópýmali og 100 mg af diemali í töflu	Tablettaa hypnopheni 0,1 g innihalda nú 50 mg af hvoru efnanna
Tablettaa noscapini (DAK50) innihéldu 15 mg af noskapín- (narkótín-) klóríði í töflu	Tablettaa noscapini 25 mg innihalda nú 25 mg

Í N63 og DD63 er víða getið heiti lyfs samkvæmt eldri forskriftabók. Þetta ber ekki að skilja á þann hátt, að forskriftirnar þurfi að vera samhljóða.

Neðangreind lyfjaform eru ýmist ekki skilgreind eða ekki notuð: Anaesthetica, Concentrata vegetabilium (heitir nú Diluenda), Cutipulveres (heitir nú Conspergentia), Diagnostica, Nebulolea (heitir nú Nebulogena), Dulciblettae, Oriblettæ, Tablettæ orales og Trochisci (en þessi 4 lyfjaform nefnast nú Tablettæ).

Skilgreining neðangreindra lyfja er nú önnur en áður var:

Aquae aromatica, Nebulogena, Succ, Tablettæ, sem einnig taka til Dulciblettæ, Oriblettæ, Tablettæ orales og Trochisci, en ekki lengur til taflna, sem ætlað er að verka eftir ísog (resorptio) gegnum munnslímhúð (Resoriblettæ).

Eftirfarandi ný lyfjaform eru nú skilgreind:

Ampullæ canulatae, Bacilli, Collyria, Implantablettæ, Intramammaria, Otoguttae, Resoriblettæ, Sera, Tubuli og Vaccina.

Technikettæ nefnast þær töflur (Tablettæ), sem innihalda efni, sem ætluð eru til tæknilegra nota.

Forskrift Guttae A-D-vitamini aquosae og Guttae A-D-vitamini fortiores er nú önnur en áður var. Vítamínmagn í dropa er hins vegar óbreytt, ef dreypt er úr dropaglasi ætlað fyrir olíulausnir, sbr. 1. bindi N63, bls. 349.

Afgreiðsla og áritun lyfja.

Að því er varðar hámarksskammta lyfja vísast til viðauka 2 með væntanlegri reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. Nokkrum hámarksskömmtum hefur verið breytt frá því sem var í D48. Sama máli gegnir um nokkur efni og samsetningar, sem skráðar voru í D48 en ekki í N63 eða DD63. Hámarksskammti eftirtalinna efna hefur verið breytt allverulega: Adrenalini bitartras, Adrenalinum, Calciferolum, Diaethylstilboestrolum, Folium digitalis standardisatum, Lobelini chloridum og Noradrenalini bitartras.

Að því er varðar áritun lyfja vísast til 8. gr. ofangreindrar reglugerðar um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja.

Áritun innvortis lyfja skal vera á hvítum merkimiða og áritunarmiða stungulyfja skal auk þess auðkenna sérstaklega með rauðri rák frá neðra vinstra horni til efra hægra horns.

Áritunarmiði útvortis lyfja skal vera rauður á lit.

Skilgreining á hugtökunum innvortis notkun og útvortis notkun er önnur en verið hefur.

Til innvortis lyfja teljast samkvæmt lyfjaskrá þau lyf, sem ætluð eru til að setja inn í líkama manna eða dýra, í eða gegnum húð eða slímhimnur, til að setja inn fyrir yarir eða inn í nasir, til að setja í rás mjólkurkirtla, inn fyrir þvagrásarop, eða inn fyrir leggangsup eða inn fyrir endaparmsup, í augu, svo og lyf, sem ætluð eru til að koma fyrir í vef eða líkamsholi, umlukin vessahimnum, sem hefur verið opnað í sambandi við skurðaðgerð.

Öll önnur lyf teljast útvortis lyf, þar með talin t. d. lyf til að bera á varirnar (t. d. varaáburður), á nefið (t. d. nefsmýrslí), á endaparminn (t. d. gyllinismýrslí), svo og lyf ætluð til sárameðferðar á yfirborði líkamans. Til að forðast misskilning hefur verið ákveðið, að augnaskolvötn, augnsmýrslí, gyllinismýrslí og nefsmýrslí, skuli ávallt auðkennd rauðum merkimiða.

Sérstök athygli er vakin á því, að nú ber að líta á augndropa sem innvortis lyf, og skal því auðkenna þá hvítum merkimiða.

Auk ofangreindra fyrirmæla um áritun lyfja, eru sérstök fyrirmæli um áritun og afgreiðslu fjölmargra efna og samsetninga.

Sérstök fyrirmæli eru um áritun neðangreindra lyfja, er ekki hafa verið skráð áður, og varðar notkun þeirra sérstaklega: Diluendum hydrocortisoni 5 mg/ml, Granlatum aminosalylcalci, Injectabile calciumtetracemindinatríi, Injectabile cincaini non vasoconstringens 1:1500 og 1:200, Injectabile tetracaini non vasoconstringens 1%, Nebulogenum isoprenalini, Solutio lidocain-adrenalini, Solutio tetracaini 2%, Technikettae halazoni 15 mg og 0,15 g, Technikettae thiosulfatis 15 mg og 0,15 g og Tetracyclini chloridum 0,1 g, 0,25 g og 0,50 g ad injectionem.

Ef lyf er tilgreint á lyfseðli með sama heiti og því, er það hefur í gildandi lyfjaskrá (forskriftasafni), en með öðrum styrkleika, skal það gert með sama hætti og hið skráða lyf og sama virkt efni (salt, efnasamband) notað, nema annars sé beinlínis getið á lyfseðlinum. Nú er lyf tilgreint á lyfseðli með öðru heiti en hinu skráða og með öðrum styrkleika og skal þá magn virks efnis lyfsins (salts, efnasambands) við hann miðaður. Þó skal styrkleiki virks efnis í lyfi ávallt tilgreindur með sama hætti og á við um hið skráða lyf og magn virks efnis við hann miðaður.

Til frekari skýringar á þessu atriði skal þess getið, að heiti margra skráðra lyfja, sem innihalda eitthvert salt eitt virkra efna, eru þannig stytta, að einungis sá hluti saltsins, sem hefur lyfjaverkun, kemur fram í nafni lyfsins. Sé lyf tilgreint á lyfseðli með þannig stytta nafni, en með öðrum styrkleika en hið skráða lyf

hefur, skal við gerð lyfsins nota sama salt og tilgreint er í gildandi lyfjaskrá (forskriftasöfnum). Ef styrkleikinn, sem jafnframt er hluti af heiti lyfsins, er miðaður við saltinnihald þess (en ekki t. d. við basainnihald þess), skal innihald samsvarandi lyfs með öðrum styrkleika einnig miðaður við saltinnihald. Sem dæmi má nefna, að hljóði lyfseðill á Tabl. codeini 10 mg, skal láta úti töflur, sem innihalda 10 mg af kódeinfosfati. Hljóði lyfseðill hins vegar á Injectabile noradrenaliní 0,2%, skal láta úti stungulyf, sem inniheldur það magn af aðrenalinbítartrati, er jafngildir 0,2% af hreinu noraðrenaliní. Nú er svo fyrir mælt í lyfjaskrá, að magn aðrenalinbítartrats og noraðrenalinbítartrats í lausnum skuli miða við hreint aðrenalin og hreint noraðrenalin. Af þessu leiðir, að hljóði lyfseðill t. d. á Solutio adrenaliní bítartratis 0,1%, þá skal láta úti lausn, er inniheldur 0,1% af adrenaliní, þ. e. a. s. 0,182% af adrenalinbítartrati. Lyfið skal áletra: Solutio adrenaliní 0,1%. Sama gildir um útlát noraðrenalinbítartratlausna.

Ef lyf er tilgreint á lyfseðli og styrkleika ekki getið, skal það látið úti eftir gildandi lyfjaskrá (forskriftasöfnum). Nú er lyfið tilgreint í gildandi lyfjaskrá (forskriftasöfnum) með fleiri en einum styrkleika, og er þá óheimilt að láta lyfið úti gegn lyfseðlinum, fyrr en gengið hefur verið úr skugga um það hjá útgefanda, hvaða lyfs sé óskað.

Bráðabirgðaákvæði.

Ef tilgreint er á lyfseðli lyf sem í lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) er frábrugðið að samsetningu því sem það var í D48, FK, D.vet.50 eða DAK50 (ásamt CMS), skal þó afhenda það eftir gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) og engu að síður, þó að það sé tilgreint með öðru nafni, nema þess sé beinlínis getið á lyfseðlinum, að lyfið óskist eftir annarri tilgreindri lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum). Þetta á þó ekki við lyfseðla, sem ritaðir eru fyrir 1. apríl 1966.

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. apríl 1966.

F. h. r.

Baldur Möller.

Jón Thors.

Skammstafanir.

CMS	Codex Medicamentarius Scandinavicus, Editio 1, hin danska útgáfa, Kh. 1951 og síðar
D48	Pharmacopoea Danica, Editio IX (ásamt viðaukum), Kh. 1948 og síðar
DAK50	DAK Præparater 1950, 7. útgáfa (ásamt viðaukum), Kh. 1951 og síðar
DD63	Dispensatorium Danicum 1963, Editio IV, Kh. 1963
D.vet.50	Dispensatorium Veterinarium 1950, Kh. 1950
FK	FK-Monografier, gefið út af lyfjaskrárnefnd Danmerkur, Kh. 1958 og síðar
N63	Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, Kh. 1963

**Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar í N63 og DD63 með nýju heiti
eða breyttum rithætti frá því er var í D48 (ásamt viðaukum), FK, D.vet.50
og DAK50 (ásamt CMS).**

A. Efni, jurta- og dýralyf.

Fyrra heiti

Acidum aceticum glaciale
Aetheroleum geranii rosati
— terebinthinae rectificatum
Aethylmorphini hydrochloridum
Alcohol absolutus
— cetylicus
— propylicus
Amidopyrinum
Aminacrini chloridum
Aneurini hydrochloridum
Antipyrinum
Apomorphini hydrochloridum
Arecolini hydrobromidum
Arseni trioxydum
Benzinum petrolei
Bibrocatinum
Bismuthi oxyjodogallas
Calcii oxydum
Champhora synthetica
Chinini hydrochloridum
Chromi trioxydum
Cincaini hydrochloridum
Cocaini hydrochloridum
Coffeino natrii benzoas
Crystalloviolaceum
Emetini hydrochloridum
Ephedrini hydrochloridum
Gelatina alba
Glycerinum
Hexylresorcinum
Histamini hydrochloridum
Homatropini hydrobromidum
Hydrargyri jodidum rubrum
— oxycyanidum
Kalii hydroxydum
Kresolum crudum
Lactoflavinum
Magnesii oxydum
— oxydum ponderosum
Metamizolum
Methyli para-oxybenzoas
Morphini hydrochloridum

Núverandi heiti

Acidum aceticum concentratum
Aetheroleum pelargonii
— terebinthinae
Aethylmorphini chloridum
Aethanolum
Cetanolum
Propanolum
Aminophenazonum
Aminoacridini chloridum
Thiaini chloridum
Phenazonum
Apomorphini chloridum
Arecolini bromidum
Arseni trioxidum
Benzinum medicinale
Bibrocatolum
Bismuthi oxijodogallas
Calcii oxidum
Camphora
Chinini chloridum
Chromi trioxidum
Cincaini chloridum
Cocaini chloridum
Coffeinum natrii benzoas
Methylrosanilinum
Emetini chloridum
Ephedrini chloridum
Gelatina
Glycerolum
Hexylresorcinolum
Histamini chloridum
Homatropini bromidum
Hydrargyri jodidum
Hydrargyri oxicyanidum
Kalii hydroxidum
Kresolum venale
Riboflavinum
Magnesii oxidum
— oxidum ponderosum
Metamizolnatrium
Methyli para-oxibenzoas
Morphini chloridum

Fyrri heiti

Narcotini hydrochloridum
 Natrii hydroxydum
 Nitroerythrolum trituratam 10%
 Nitroglycerinum solutum concentratum 10%
 Opium crudum
 Oxychinolini sulfas
 Oxyconi hydrochloridum
 Papaverini hydrochloridum
 Pasta cacao deoleata
 Pentazolum
 Penticidum
 Pethidini hydrochloridum
 Phenantoinum
 Pilocarpini hydrochloridum
 Procaini hydrochloridum
 Pyrogalloli triacetat
 Resorcinum
 Saccharum lactis
 Salolum
 Scopolamini hydrobromidum
 Solutio formaldehydi
 Solutio hydrogenii peroxydi concentrata
 Solutio kalii hydroxydi venalis
 Spiritus alcoholisatus
 Stilboestrolum
 Synstigmini bromidum
 Tetracaini hydrochloridum
 Tocoferyli succinas
 Zinci oxydum venale

Núverandi heiti

Noscapini chloridum
 Natrii hydroxidum
 Trituratio erythryli nitratis 10%
 Diluendum glyceryli nitratis 10%
 Opium
 Oxichinolini sulfas
 Oxiconi chloridum
 Papaverini chloridum
 Cacao
 Pentetrazolum
 Chlorphenothanum
 Pethidini chloridum
 Phenytoinum
 Pilocarpini chloridum
 Procaini chloridum
 Pyrogalloli acetat
 Resorcinolum
 Lactosum
 Phenyli salicylas
 Scopolamini bromidum
 Solutio formaldehydi concentrata
 — hydrogenii peroxydi concentrata
 — kalii hydroxydi venalis 10 M
 Spiritus fortis
 Diaethylstilboestrolum
 Neostigmini bromidum
 Tetracaini chloridum
 Dextocoferyli succinas
 Zinci oxidum

B. Samsetningar.

Fyrri heiti

Acetonum rotenoni 5%
 Acidum aceticum
 — hydrochloricum dilutum
 — sulfuricum dilutum
 Aether jodoformii
 Amylii nitris ad ampullam
 Aqua hydrargyri oxycyanidi
 — ophthalmica boraxata
 — phenoli
 — redestillata sterilisata
 Capsulae extracti filicis
 — olei ricini
 — tetrachloraethyleni
 — tetrachloraethyleni 32 cg
 — tetrachloraethyleni 80 cg

Núverandi heiti

Acetonum rotenoni 5% vet.
 Acidum aceticum 5 M
 — hydrochloricum 2 M
 — sulfuricum 1 M
 Aether jodoformii vet.
 Vitrella amylii nitritis
 Collyrium hydrargyri oxycyanidi
 — boracis
 Aqua phenoli 2%
 — purissima sterilisata
 Capsulae extracti filicis 1 g
 Capsulae olei ricini 2,5 g
 — tetrachloraethyleni 1 ml
 — tetrachloraethyleni 0,2 ml
 — — 0,5 ml

Fyrri heiti

Causticum chromi trioxydi
 — zinci chloridi fortius
 Concentratum glycyrrhizae
 — ipecacuanhae
 — senegae
 — thymi
 — valerianae
 Cremor simplex
 Cutipulvis amyceni
 — calomelanos
 — paraformaldehydi
 — penticidi
 — salicylicus
 — talci zincicus
 Diagnosticum fluorosceini
 Dosipulvis albumini tannatis
 — antipyrini
 — ferrosi tartratis
 — salinus compositus
 — salinus cum aloe
 Dulciblettae magnibellini
 Emulsio penticidi
 Folium digitalis
 Formaldehydum saponatum
 Glycerinum jodi
 Glycerinum spirituosum
 Granulatum amyli solani ad tablettas
 — ferroplex
 Guttae adetamini fortiores
 — — aquosae
 — calciferoli ultraconcentratae
 — kalii arsenitis
 — nitroglycerini fortiores
 — pentazoli
 — pethidini
 — tetraconi
 Hydrargyri amido chloridum pultiforme
 — oxydum pultiforme
 Injectabile adrenalini
 — amphetamini
 — aneurini 2,5%
 — atropini
 — atropini fortius
 — calciferoli
 — calcii chloridi
 — — et magnesi chloridi
 — calciumtetracemindinatritii 10%
 — carbacholini fortius
 — enhexymalnatrii 0,5 g
 — enhexymalnatrii 1 g

Núverandi heiti

Causticum chromi trioxidi 33%
 — zinci chloridi 50% vet.
 Diluendum glycyrrhizae
 — ipecacuanhae
 — senegae
 — thymi
 — valerianae
 Cremor vaselini
 Conspergens amyceni
 — calomelanos
 — paraformaldehydi
 — chlorphenothani
 — salicylicum
 — zinci
 Oculoguttae fluoresceini
 Dosipulveres albumini tannatis 1 g
 — phenazoni 1 g
 — ferrosi tartratis 0,25 g
 — salini compositi vet.
 — — cum aloe vet.
 Tablettae magnibellini
 Emulsio chlorphenothani
 Folium digitalis standardisatum
 Formaldehydum saponatum vet.
 Glycerolum jodi 2%
 — spirituosum
 Granulatum amyli ad tablettas
 — ferrosi tartratis
 Guttae A-D-vitamini fortiores
 — — aquosae
 Oleum calciferoli ultraconcentratum
 Solutio kalii arsenitis 1%
 Guttae glyceryli nitratis 1%
 — pentetrazoli
 — pethidini 5%
 — tetraconi 2%
 Trituratio hydrargyri amidochloridi 20%
 — hydrargyri oxidi 20%
 Injectabili adrenalini 0,1%
 — amphetamini 5%
 — thiamini 2,5%
 — atropini 0,1%
 — atropini 1% vet.
 — calciferoli vet.
 — calcii chloridi 10% vet.
 — calcii et magnesi chloridorum vet.
 — calciumtetracemindinatritii
 — carbacholini 0,1% vet.
 Enhexymalnatrium 0,5 g ad injectionem
 — 1 g ad injectionem

Fyrri heiti

Injectabile lactoflavini

- magnesi chloridi
- metamizoli
- metaoxedrini
- methacholini 15 mg

- methadoni
- morphini
- natrii sulfatis
- oxyconi
- pentazoli
- pethidini
- pilocarpini
- — fortius
- procain-adrenalini mite
- stilboestrolí 1% vet.
- synstigmini
- tetraconi
- theophyllamini fortius
- — mite

Linimentum aloes compositum

- kreolini sulfuratum
- styracis
- sulfuratum compositum

Liquor pectoralis benzoicus cum glycerino

Mixtura bismuthi cum opio

- — subsalicylatis
- chlorali hydratis
- magnesi hydroxydi
- theobromino natrii salicylatis

Nebulogenum hectolini

Oculentum album

- bibrocathini
- coloratum

Oculoguttae aethylmorphini

- argenti nitratis
- cocaini
- pilocarpini
- resorcini
- tetracaini
- zinci boricae

Opium

Oriblettae benzocaini

Pasta antipsoriatica

- resorcini composita

Phenolum liquidum

Pilulae arseni trioxydi

- atropini minores

Núverandi heiti

Injectabile riboflavini

- magnesi chloridi 10% vet.
- metamizoli 50% vet.
- metaoxedrini 1%

Methacholini bromidum 15 mg ad injectionem

Injectabile methadoni 1%

- morphini 2%
- natrii sulfatis 20%
- oxiconi 1%
- pentetrazoli
- pethidini 5%
- pilocarpini 2%
- pilocarpini 5% vet.
- procain-adrenalini 0,5%
- diaethylstilboestrolí 1% vet.
- neostigmini
- tetraconi 2%
- theophyllamini 20%
- — 2%

Linimentum aloes compositum vet.

- kreolini sulfuratum vet.
- styracis vet.
- sulfuratum compositum vet.

Liquor pectoralis benzoicus cum glycerolo

Mixtura bismuthi subsalicylatis cum opio vet.

- bismuthi
- chlorali
- magnesi hydroxydi
- theobromini

Nebulogenum hektolini

Oculentum amidohydrargyricum

- bibrocatholi
- amidohydrargyricum coloratum

Oculoguttae aethylmorphini 2%

- argenti nitratis pro neonatis
- cocaini 2%
- pilocarpini 2%
- resorcinoli
- tetracaini 1%
- zinci

Opium pulveratum

Tablettae benzocaini 0,1 g

Pasta chrysarobini composita

- resorcinoli composita

Phenolum liquefactum 90%

Tablettae arsenicales 1 mg

- atropini 0,25 mg

Fyrri heiti

Pilulae A-vitami

- colchicini
- hexylresorcini
- phenolphthaleini compositae
- sagralini
- sagralini fortiores
- scopolamini
- valerianae
- — barbituricae

Pulvis ammonii compositus

- barii sulfatis diagnosticus

Solublettae chiniofoni

- chloramini
- sublimati

Solutio acidi borici

- adrenalini
- aluminii subacetatis concentrata
- aminacrini
- argenti nitratis prophylactica
- calcii hydroxydi
- — polysulfidi
- calcis chloratae concentrata
- crystalloviolacei
- ephedrini
- euflavini fortior
- — mitis
- hydrogenii peroxydi
- kalii arsenitis concentrata
- natrii chloridi isotonica
- procaini chloridi simplex pro injectione 1%

Spiritus aminacrini

- crystalloviolacei
- formaldehydi fortior
- — mitis
- jodi
- penticidi
- saloli

Suppositoria glyphyllini

- haemorrhoidalia
- morphini

Suspensio barii sulfatis ad diagnosin
0,7 g/ml

- carbonis

Syrupus aethylmorphini compositus

Tablettae acetphenolisatini

- acidi acetylsalicylici
- — ascorbici
- — nicotinici
- aciglumini

Núverandi heiti

Pilulae A-vitami 25000 IE

- Tablettae colchicini 0,5 mg
- hexylresorcinoli 0,1 g
- phenolphthaleini compositae
- sagralini
- sagralini fortiores
- scopolamini 0,1 mg
- valerianae
- — barbituricae

Pulvis ammonii compositus vet.

- barii sulfatis ad diagnosin

Solublettae chiniofoni 0,25 g

- chloramini 1 g
- sublimati 0,5 g vet.

Solutio borica 2%

- adrenalini 0,1%

Diluendum aluminii subacetatis 8%

Solutio aminoacridini

- argenti nitratis prophylactica 2%
- calcii hydroxydi
- — polysulfidi vet.

Diluendum calcis chloratae

Solutio methylrosanilini

Rhinoguttae ephedrini

Solutio euflavini 1%

Aqua euflavini

Solutio hydrogenii peroxidi 3%

- kalii arsenitis concentrata vet.
- natrii chloridi 0,9%

Injectabile procaini non vaso
constringens 1%

Spiritus aminoacridini

- methylrosanilini
- formaldehydi 10%
- — 3,6%
- jodi 5%

- chlorphenothani

- phenyli salicylatis

Suppositoria glyphyllini 0,5 g

- bijogali
- morphini 20 mg

Suspensio barii sulfatis ad diagnosin

- carbonis vet.

Syrupus aethylmorphini

Tablettae acetphenolisatini 5 mg

- acetylsalicylicae 0,5 g
- ascorbicae 50 mg
- acidi nicotinici 50 mg
- aciglumini 0,3 g

Fyrri heiti

Tablettae albumini tannatis

- allypropymali
- amidopyrini 0,1 g
- — 0,3 g
- amphetamini
- aneurini
- apronali
- arecolini
- bellapani
- betaini chloridi
- bismuthi subsalicylatis
- bromisovalii
- calcii chloridi
- — lactatis
- carbromali
- chiniofoni
- codeimagnyli
- — non obstipantes
- codeini
- codeipheni
- — non obstipantes
- coffeini
- coffeo-antipyriini
- coffeo-phenacetini
- dicumaroli
- diemali
- diphenhydramini
- enhexymali
- ethinyloestradioli mikrogram 50
- euflavini orales
- ferrosi tartratis
- glyceryli nitratis 0,25 mg
- hexemalcalcii
- hydroconi
- isoniazidi
- lactoflavini
- menadioni
- mepacrini
- mephenetoini
- meprobamati
- mepyrmini
- methadoni
- methylatropini bromidi
- methylscopolamini
- methylthiouracili
- natrii bicarbonatis
- nicotinamidi
- nitroerythroli majores
- — minores
- nitroglycerini 0,25 mg

Núverandi heiti

Tablettae albumini tannatis 0,5 g

- allypropymali 0,1 g
- aminophenazoni 0,1 g
- aminophenazoni 0,3 g
- amphetamini 5 mg
- thiamini 3 mg
- apronali 0,25 g
- arecolini 10 mg vet.
- bellapani 0,3 mg
- betaini 0,25 g
- bismuthi 0,5 g
- bromisovalii 0,3 g
- calcii chloridi 1 g
- — lactatis 0,5 g
- carbromali 0,5 g
- chiniofoni 0,25 g
- codimagnyli
- — non obstipantes
- codeini 25 mg
- codipheni
- — non obstipantes
- coffeini 0,1 g
- coffeini phenazoni
- — phenacetini
- dicumaroli 20 mg
- diemali 0,25 g
- diphenhydramini 50 mg
- enhexymali 0,25 g
- ethinyloestradioli 50 mikrogram
- euflavini
- ferrosi tartratis 0,25 g
- Resoriblettae glyceryli nitratis 0,25 mg
- Tablettae hexemali 0,1 g
- hydroconi 5 mg
- isoniazidi 0,1 g
- riboflavini 3 mg
- menadioni 10 mg
- mepacrini 0,1 g
- mephenetoini 0,1 g
- meprobamati 0,4 g
- mepyrmini 50 mg
- methadoni 5 mg
- methylatropini 0,5 mg
- methylscopolamini 0,5 mg
- methylthiouracili 0,1 g
- natrii bicarbonatis 0,5 g
- nicotinamidi 50 mg
- erythryli nitratis 30 mg
- — — 5 mg
- Resoriblettae glyceryli nitratis 0,25 mg

Fyrri heiti

Tablettaa nitroglycerini 0,5 mg

- oxedrini
- oxyconi
- papaverini
- pentanitroli majores
- pentymali
- pethidini
- phenacetini
- phenantoini
- phenemali
- — minores
- phenolphthaleini
- phthalylsulfathiazoli
- piperazini adipatis
- probenecidi
- propylthiouracili
- pyridoxini
- riboflavini
- salipyrini
- saloli
- stilboestroli majores
- — minores
- sulfacombini
- sulfadiazini
- sulfadimidini
- sulfamethizoli minores
- synstigmini
- thebaconi
- theobromini
- — calcii salicylatis
- theophyllini
- tolazolini

Trituratio camphorae (1+9)

Trochisci calcii gluconatis

- magnesii silicatis

Unguentum amidohydrargyricum

- amyceni
- argenti nitratis
- benzalkoni
- benzocaini
- Besnier
- calomelanos prophylacticum
- camphoratum
- cantharidis cum euphorbio
- cetacei
- chlorbutoli
- — benzocaini
- cincaini
- dermotheli
- — simplex

Núverandi heiti

Resoribletaa glycerylí nitratis 0,5 mg

Tablettaa oxedrini 0,1 g

- oxiconi 5 mg
- papaverini 40 mg
- pentanitroli 30 mg
- pentymali 0,1 g
- pethidini 25 mg
- phenacetini 0,5 g
- phenytoini 0,1 g
- phenemali 100 mg
- — 15 mg
- phenolphthaleini 0,1 g
- phthalylsulfathiazoli 0,5 g
- piperazini 0,3 g
- probenecidi 0,25 g
- propylthiouracili 0,1 g
- pyridoxini 20 mg
- riboflavini 3 mg
- phenazoni salicylatis 0,5 g
- phenyli salicylatis 0,5 g
- diaethylstilboestroli 1 mg
- — 0,1 mg
- sulfacombini 0,5 g
- sulfadiazini 0,5 g
- sulfadimidini 0,5 g
- sulfamethizoli 0,1 g
- neostigmini 15 mg
- thebaconi 5 mg
- theobromini 0,5 g
- calciumtheobromini 0,5 g
- theophyllini 0,1 g
- tolazolini 25 mg

Trituratio camphorae 10%

Tablettaa calcii gluconatis 0,5 g

- magnesii silicatis 0,5 g

Unguentum amidohydrargyricum

- amyceni
- argenti nitratis
- benzalkoni
- benzocaini
- pyrogalloli compositum
- calomelanos prophylacticum
- camphoratum
- cantharidis cum euphorbio vet.
- cetacei
- chlorbutoli
- — benzocaini
- cincaini
- dermotheli
- — simplex

Fyrri heiti

Ungventum glycerini

— glycodermi

— — simplex

— hepatis sulfuris

— hydrargyri jodidi

— lanolini compositum

— mentholi compositum

— molle

— nitrofurazoni

— salicylicum

— sulfuris salicylicum

— topicini

— — cum hydrocortisono

Vagitoria acetarsoli

Núverandi heiti

Unguentum glyceroli

— glycodermi

— — simplex

— hepatis sulfuris

— hydrargyri jodidi

— lanolini compositum

— mentholi compositum

— molle

— nitrofurazoni

Pasta salicylica

Unguentum sulfuris salicylicum

— topicini

— — cum hydrocortisono

Vagitoria acetarsoli 0,25 g

Viðauki 2

Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar, þar sem breytt hefur verið fyrir-
mælum um innihald eða samsetningu frá því sem verið hefur.

A. Efni, jurta- og dýralyf.

Skrá yfir efni, jurta- og dýralyf í D48 (ásamt viðaukum), FK eða CMS (hinni
dönsku útgáfu), sem nú eru skráð í N63, en þó verulega frábrugðin að samsetningu
og jafnvel undir öðru heiti:

Acidum folicum

Cacao

Calcii oxidum

Chlorbutolum

Colchicinum

Cortex cinchonae

Menadioni natrii bisulfis

Mentholum

Natrii lactas

— riboflavinophosphas

Oleum jecoris aselli

Oxichinolini sulfas

Paraffinum liquidum

Saccharinnatrium

Solutio hydrogenii peroxidi concentrata

Thiamini chloridum

B. Samsetningar.

Skrá yfir samsetningar í D48 (ásamt viðaukum), FK, D.vet.50 eða DAK50, sem
nú eru skráð í N63 eða DD63, en þó verulega frábrugðin að samsetningu og jafnvel
undir öðru heiti:

1. Fullgerð lyf frábrugðin að samsetningu að því er magn virkra efna varðar.

Fyrri heiti

Capsulae carbonei sulfidi (6 g)

— tetrachlormethani (1,6 g)

Causticum argenti nitratis (40%)

Conspersgens topicini (1,5%)

Cutipulv. contra intertriginem (10%
af bórsýru)

Núverandi heiti

Capsulae carbonei sulfidi 4 ml (5 g)

— tetrachlormethani 0,5 ml (0,8 g)

Causticum argenti nitratis 50%

Conspersgens topicini (0,75%)

— zinci borici (5%)

Fyrri heiti

- Granulatum aminosalyli (70% af amínósalyli)
 Granulatum carbonis cum magnesii sulfate (10 g + 15 g)
 Injectabile arecolini (20 mg/ml)
 — ascorbidi (20 mg/ml)
 — calcii borogluconatis 17 mg/ml Ca)

- ergometrini fortius (0,25 mg/ml af ergómetríni)
 — ergometrini mite (0,1 mg/ml af ergómetríni)
 — menadioni (5 mg/ml)
 — noradrenalini (0,1 mg/ml af noraðrenalíni)
 — procain-adrenalini dentale 1% (15 mikróg/ml af aðrenalíni)
 — procain-adrenalini fortius (35 mikróg/ml af aðrenalíni)
 — procain-adrenalini dentale 2% (30 mikróg/ml af aðrenalíni)
 — scopolamini (1 mg/ml)
 — g-strophanthini (0,1 mg/ml)

Mixtura senegae jodata composita

- Oculentum flavum (2,5%)
 Oculoguttae atropini (0,5%)
 — homatropini (0,5%)
 — physostigmini (1%)
 — scopolamini (0,1%)

Pasta aluminii subacetatis (1,2% af hreinu álsúbasetati, 15% af sinkoxíði)

Pilulae atroscopolamini

- opiopapaverini atropicae (1 mg af metýlatrópínbrómíði, 10 mg af tetrapóni í pillu)

Solutio citratis et glucosi ad transfusionem (3% af þrúgusykri)

- jodi cum kalii jodido concentrata (10% af joði, 30% af kalíumjoðiði)
 — kalii permanganatis concentrata (3,3%)

Suppositoria atroscopolamini

- benzocaini composita (0,25 g af bensókaini, 0,5 g af vismútóxiþjóðgallati í stíl)
 — opiopapaverini atropica (1 mg af

Núverandi heiti

- Granulatum aminosalylcalcii (a. m. k. 75% af amínósalylkalsíum)
 — carbonis et natrii sulfas (10 g + 30 g)

- Injectabile arecolini 1% vet. (10 mg/ml)
 — ascorbicum 10% (100 mg/ml)
 — calcii borogluconatis vet. 14 mg/ml Ca)

- ergometrini (0,2 mg/ml af ergómetrinmaleati)
 — menadioni (10 mg/ml)
 — noradrenalini 0,1% (1 mg/ml)

- procain-adrenalini 1% (5 mikróg/ml)

- — 2% (5 mikróg/ml)

- scopolamini (0,3 mg/ml)
 — g-strophanthini (0,25 mg/ml)

Mixtura senegae jodata (er nú án lobeliúdropa)

- Oculentum hydrargyri oxidi (2%)
 Oculoguttae atropini 1%

- homatropini 1%
 — physostigmini 0,5%
 — scopolamini 0,2%

Unguentum aluminii subacetatis (1,6%, ekkert sinkoxíð)

Tablettae atroscopolamini (nú einnig með 25 mg af fenemali í töflu)

- morphatropini cum papaverino (0,5 mg af atrópínsúlfati og 10 mg af morfínklóríði í töflu)

Solutio citratis glucosi (1,47%)

- Diluendum jodi 10% (20% af kalíumjoðiði)

- Diluendum kalii permanganatis 3%

Suppositoria atroscopolamini (nú einnig með 50 mg af fenemali í stíl)

- benzocaini composita (0,2 g af bensókaini, 0,2 g af vismútóxiþjóðgallati í stíl)
 — morphatropini cum papaverino (0,5

Fyrri heiti

- metýlatrópínbrómiði, 10 mg af tetrapóni í stíl)
- Tablettae acidi citrici (0,5 g)
- carbacholini (1 mg)
 - chinidini (0,1 g)
 - coffeotyli (0,45 g af aspiríni í töflu)
 - digitalis (100 mg)
 - ephedrini (25 mg)
 - ergometrini (0,5 mg af ergómetrini í töflu)
 - glyphyllini (0,2 g)
 - hypnopheni (0,2 g)
 - nitrofurantoini 20 mg
 - 100 mg
 - noscapini (15 mg)
 - theobromino calcii acetatis (0,25 g af teóbrómíni, 0,375 g af kalsíumasetati í töflu)
- Trochisci santonini (30 mg)
- Ungventum aluminii subacetatis (1% af hreinu álsúbasetati)

Núverandi heiti

- mg af atrópínsúlfati, 10 mg af morfínklóriði í stíl)
- Tablettae citricae 0,4 g
- carbacholini 2 mg
 - chinidini 0,2 g (eru nú sykurhúðaðar)
 - coffeotyli (0,5 g af aspiríni í töflu)
 - digitalis 50 mg (nú litarhúðaðar)
 - ephedrini 20 mg
 - ergometrini 0,5 mg (0,5 mg af ergómetrínmaleati í töflu)
 - glyphyllini 0,25 g
 - hypnopheni 0,1 g
 - nitrofurantoini 50 mg
 - noscapini 25 mg
 - calciumtheobromini 0,5 g (0,5 g af teóbrómínkalsíumsalísýlati í töflu)
 - santonini 25 mg (áritist: tyggist vandlega)
- Unguentum aluminii subacetatis (1,6%)

2. Fullgerð lyf frábrugðin að því er varðar útlit, lykt, bragð eða magn óvirkra efna.

Fyrri heiti

- Aqua hydrargyri oxycyanidi
- Injectabile apomorphini ad ampullam (1 ml af stungulyfi (10 mg/ml)
- pentymali 10% (25% af úretani)
- Mixtura chlorali hydratis (með piparmyntuvatni)
- Oriblettae benzocaini (25 mg af tólúdropum í töflu)
- Pilulae A-D-vitamini (rauðar á lit)
- arseni trioxydi
 - atropini minores
 - chinini (0,1 g af kínskúlfati í pillu)
 - colchicini
 - scopolamini
- Solublettae hydrargyri phenylacetatis (0,25 g af fenýlmerkúríasetati í töflu)
- Solvens ad penicillinum (fosfatlausn)
- Syrupus aethylmorphini compositus (0,015% af mentóli, 5% af blóðbergsþykkni, 45% af tólúsaft, 45% af sólberjasaft)

Núverandi heiti

- Collyrium hydrargyri oxycyanidi (nú litlaust)
- Apomorphini chloridum 10 mg ad injectionem (þurrt efnið í glerhylki)
- Injectabile pentymali 10% (40% af propýlenglýkóli)
- Mixtura chlorali (með Syrupus aurantii, 25%)
- Tablettae benzocaini 0,1 g (5 mg af mentóli í töflu)
- Pilulae A-D-vitamini (gular á lit)
- Tablettae arsenicales 1 mg
- atropini 0,25 mg
 - chinini 0,1 g (0,1 g af kínskúlfati í töflu)
 - colchicini 0,5 mg
 - scopolamini 0,1 mg
- Solublettae phenylhydrargyri nitratis (0,25 g af fenýlmerkúrínitratu í töflu)
- Solvens ad penicillinum (sítatlausn)
- Syrupus aethylmorphini (með sólberjasoft)

Fyrri heiti

Syrupus B-combini (5% af lakkrispykkni,
50% af sykursaft)
— codeicus mitis (0,2% af kódeíni leyst
í sykursaft)
Tablettae ammonii chloridi

Núverandi heiti

Syrupus B-combini (með kirsuberja-
saft)
Syrupus codeini (0,25% af kódeinfosfati
leyst í sólberjasaft)
Tablettae ammonii chloridi 0,5 g (húðað-
ar þannig, að töflurnar leysist ekki í
magasafa)

3. Samsetningar, er til þessa hafa ekki verið rotvarðir, en nú skal rotverja.

Collyrium boracis
Decoctum cinchonae senegae
Infusum ipecacuanhae
— — compositum
— valerianae
Injectabilia (vatnslausnir í hettuglösum,
ef einstakur skammtur fer ekki fram
úr 10 ml)

Mixtura ipecacuanhae pro infantibus
Oculoguttae
Rhinoguttae ephedrini
Solutio adrenalini 0,1%
— borica 2%
Syrupus anisi

4. Við gerð neðangreindra smyrsla er víkið allverulega frá áður notuðum
burðarefnum.

Oculentum amidohydrargyricum
— coloratum
— bibrocatholi
— chloramphenicoli

Oculentum nitrofurazoni
— simplex
Unguentum camphoratum
— molle

5. Þvermáli neðangreindra töflutegunda hefur verið breytt frá því sem áður var.

Tablettae apronali 0,25 g
— arecolini 10 mg vet.
— ascorbicae 50 mg
— betaini 0,25 g
— calciumtheobromini 0,5 g
— codeini 25 mg
— erythryli nitratis 30 mg
— hexylresorcinoli 0,1 g
— hydroconi 5 mg
— meprobamati 0,4 g
— methadoni 5 mg

Tablettae methylatropini 0,5 mg
— neostigmini 15 mg
— oxiconi 5 mg
— papaverini 40 mg
— pentanitroli 30 mg
— phenolphthaleini compositae
— pyridoxini 20 mg
— sagralini
— — fortiores
— valerianae
— — barbituricae

6. Forskriftum neðangreindra samsetninga, sem notaðar eru við lyfjagerð,
hefur verið breytt allverulega.

Aqua menthae piperitae
Bellapanum
Diluendum calciferoli aquosum forte
300 000 IE/g
— — forte 300 000 IE/g
— — mite 30 000 IE/g
— extracti belladonnae 50%
Extractum valerianae siccum

Mucilago amyli
Pulvis cacao ad obductionem
— sacchari ad obductionem
Solutio ammoniae 5 M
Trituratio bismuthi subsalicylatis 16,7%
— extracti belladonnae 20%
— — hyoscyami 20%
Vernix enterosolubilis