

REGLUGERÐ

um lyf og læknisáhöld í íslenskum skipum.

1. gr.

Bátar eða skip, hverju nafni sem nefnast og skoðunarskyld eru að lögum, skulu jafnan hafa lyfjakistu eða lyfjaskáp meðferðis, þannig búna að lyfjum, umbúðum og áhöldum og að öðru leyti svo úr garði gert, sem fyrir er mælt í þessari reglugerð. Slikir skápar eða kistur eru hér nefndar einu heiti **lyfjakistur**. Öll lyf í venjulegri merkingu, sótthreinsandi efni, hjúkrunargögn alls konar og áhöld, sem í lyfjakistum skipa eru nefnd **lyf** einu heiti. **Fíknilyf** (euforetica: ávana- og nautnalyf) eru þau lyf og lyfjasamsetningar, sem svo eru greind í reglugerð um gerð lyfseðla og afhendingu lyfja.

Með **strandsiglingum** er átt við siglingar við strendur og um landgrunn Íslands, lengst 150 sjómílur frá Íslandi. Með **Evrópuferðum** er átt við siglingar íslenzkra skipa fjær landi en 150 sjómílur, en innan þess svæðis, er takmarkast af 80° norðl. br., 42° austl. l., 30° norðl. br. og 60° vestl. l. **Langferðir** kallast siglingar íslenzkra skipa utan þess svæðis, er að ofan greinir.

2. gr.

Lyfjakistur eru 6 talsins og auðkenndar með tölunum 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Skipum er skipt í flokka eftir því, hvar þau eru í förum og hve margir eru flest á skipsfjöln. Skyld er að hafa eina hinna 5 fyrst talinna lyfjakistna, merkta sinni tölu, um borð í skipum, svo sem sýnt er í fylgjandi töflu.

Fjöldi manna á skipi.	Skip í strand- siglingum.	Skip í Evrópu- siglingum.	Skip í lang- ferðum.
6 eða færri	1	4	5
7—20	2	4	5
21 eða fleiri	3	4	5

Í björgunarbátum, flekum og gúmmibjörgunarbátum, sem krafizt er að lyf séu í samkvæmt öðrum reglum, skal vera lyfjakista nr. 6.

Skip, sem eru reglulega í förum, skulu búnir lyfjakistu 1, ef sigling leiðarenda á milli tekur lengri tíma en hálf klukkustund, en skemmri tíma en 3 klukkustundir. Nú er skipi að jafnaði haldið úti í strandsiglingum, en fer þó stundum ferðir utan landgrunnsins, og skal skipaskoðunarstjóri þá kveða nánar á um, hvort lyfjakista 3, 4 eða 5 sé í skipinu. Skipaskoðunarstjóri getur heimilað, að lyfjakista 4 sé í skipum, sem sigla á austurströnd Bandaríkja Norður-Ameríku.

Heimilt er að skylda skipstjóra til þess að varðveita fíknilyf sérstaklega undir lás og loku og skal skipstjóri hlíta fyrirmælum skipaskoðunarstjóra í þessu efni.

3. gr.

Magn lyfja í lyfjakistum 1—5 (sbr. lista um búnað lyfjakistna) er minnsta magn. Skipstjóri getur krafizt, að meira magn lyfja sé sett í lyfjakistu skips hans (sjá þó 2. málsg.).

Ef skipslæknir er enginn, má ekki auka magn fíknilyfja í lyfjakistum umfram það, sem ákveðið er í lista um búnað skipskistna. Ef læknir er fastráðinn til starfa á skipi, getur hann á sína ábyrgð aukið birgðir af fíknilyfjum og ávísað.

4. gr.

Lyf skulu vera í tryggum umbúðum. Á umbúðum standi (prentað eða vélritað) heiti lyfja, ábendingar um gjöf og notkun, svo sem við verður komið eða

þörf krefur, og fyrningartími, ef einhver er. Á umbúðum lyfja standi mánaðardagur þess árs, er lyfið var selt úr lyfjabúð. Æskilegt er, að lyfjabúðir selji í lyfjakistur einungis þær umbúðareiningar, er um getur í listum um búnað lyfjakistna.

Fíknilyf skal merkja **ATH**.

Áhöld úr málm skulu vera úr ryðfriú stáli.

5. gr.

Lyf til notkunar innvortis skulu, nema annað sé tekið fram í listum um búnað lyfjakistna, vera í sléttum og sívölum glösum með skrúfloki (C S B 162, 163) eða í málmhylkjum. Ákjósanlegt er einnig, að töflur séu pakkaðar ein og ein í sérstökum þynnum („foil pökkun“). Sótthreinsandi efni skulu vera í umbúðum svo ólíkum þeim, sem notaðar eru undir lyf til innvortis notkunar, að ekki verði um villt.

Lyfjakistur 1—5 skal varðveita á þurrum stað, þar sem helzt ekki er lægra hitastig en 4° C, né hærra en 25° C. Lyfin skulu vera aðgengileg skipslækni, ef einhver er, skipstjóra eða staðgöngumanni hans, en engum öðrum. Ef insúlín er haft í skipum, skal geyma það við ca. 4° C (insúlín er heimilt að geyma utan lyfjakistna).

Lyfjakistu 6 skal geyma í vatnspéttum, lokuðum og innsigliðum umbúðum, sem greinilega eru merktar „Lyfjakista 6“ og áletraðar þeirri dagsetningu, er eftirlit fór síðast fram í islenzkri lyfjabúð.

6. gr.

Skipslæknir, útgerðarmaður eða skipstjóri getur ávísað skipi sínu þeim lyfjum, sem vera eiga í lyfjakistu skipsins. Lyf, sem þannig er ávísað, má einungis nota við lækningar á skipshöfn og farþegum þess skips, er um ræðir. Lyfjaávisanir á skip skal senda skriflega til lyfjabúðar þeirrar, er lyfin selur.

Lyfjabúðum er hverju sinni skylt að gera vörureikning um sölu lyfja til skipa. Tvö eintök skulu fylgja lyfjunum, en hið þriðja skal varðveita 2 ár í lyfjabúð þeirri, er lyfin selur.

Lyfjakistur skulu vera fullbúnar í byrjun hvorrar sjóferðar. Nú er verulegt magn lyfja notað, meðan á sjóferð stendur. Skal þá við fyrsta tækifæri fylla í skóðin með nýjum innkaupum. Ef lyf eru keypt erlendis, skal skipstjóri færa í dagbók skipsins, hvaða lyf voru keypt og í hve miklu magni.

Skipstjóra er skylt að færa í dagbók skipsins alla notkun fíknilyfja. Þó skal hann undanþeginn þessari kvöð, ef skipslæknir er starfandi um borð.

7. gr.

Skipslækni, skipstjóra eða staðgöngumanni hans er einum heimilt að afhenda lyf úr lyfjakistum.

Slegnar lyfjaeiningar til notkunar innvortis skal setja í viðeigandi umbúðir með áletrunum ábendingum um notkun, sé lyfjanna ekki neytt í augstýningu þess, er afhendir þau úr lyfjakistu. Lyf til innstungu má einungis nota í augstýningu skipslæknis, skipstjóra eða staðgöngumanns hans. Með lyf skal ella fara svo sem segir í gildandi lækningabók sjófarenda og samkvæmt því sem gefið er sérstaklega til kynna á lyfjaumbúðum.

8. gr.

Eftirlit skal fara fram árlega á lyfjakistum 2, 3, 4 og 5. Eftirlitið framkvæmir íslensk lyfjabúð að beiðni skipstjóra. Að eftirliti loknu er gefið út vottorð, er gildir í eitt ár og skipstjóri varðveitir.

Nú er skip í langferðum og kemur ekki í höfn á Íslandi innan árs frá því, er eftirlit fór síðast fram. Skipstjóra er þá skylt að framkvæma eftirlit með lyfjakistu skips síns.

Eftirlit með lyfjakistu 6 skal framkvæma í lyfjabúð annað hvert ár.

Skipaskoðunarstjóri eða fulltrúar hans geta krafist skipstjóra um eftirlitsvottorð lyfjabúðar og vörureikninga yfir keypt lyf.

9. gr.

Í skipi, þar sem lyfjakista er, skal vera minnst eitt eintak af gildandi lækningabók fyrir sjófarendur, minnst eitt eintak af listum um útbúnað lyfjakistna í skipum, svo og eitt eintak af þessari reglugerð. Í skipum, sem koma í erlendum hafnir, skal vera eitt eintak af síðustu útgáfu bókar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar **World Directory of Venereal-Disease Treatment Centres at Ports** og hæfilega mörg eintök af **Personal Booklet**, sem gefið er út af sömu stofnun til leiðbeininga um meðferð á kynsjúkdómum í hafnarborgum. Enn fremur eiga að vera um borð í ofangreindum skipum eyðublöð, sem ætluð eru til útfyllingar, þegar lækni er leitað um loftskeyti (Radio Medical).

Í lyfjakistu 6 á að vera stuttur leiðarvísir um hjálp í viðlögum.

10. gr.

Allir skráningaskyldir, opnir bátar skulu vera búnir lyfjakistu nr. 1, en í því skal vera:

A. Lyf til útvortis notkunar:

1. Joðáburður (Spiritus jodi Ph. D.) 20. g: 1 glas, til sóttþreinsunar á hörundi. Áburður á bólgu.
2. Bruna- og sárasmýrslí (Unguentum aureomycini 3%) 30 g: 1 tinbelgur. Við bruna, sárum og kaunum.

B. Umbúðir.

1. Heftiplástur 2 sm × 1 m: 1 spóla.
2. Skyndiplástur 4 sm × 1 m: 1 dós. — 6 sm × 1 m: 1 dós.
3. Sárallín 15 sm × 15 sm: 5 böggjar. — 30 sm × 30 sm: 5 böggjar.
4. Sárallínsbindi 5 sm × 5 m: 4 bindi — 8 sm × 5 m: 2 bindi.
5. Sjúkrabaðmull 10 g: 2 böggjar. — 30 g: 2 böggjar.

C. Áhöld.

1. Skæri.
2. Flísatöng.

11. gr.

Samgöngumálaráðherra getur að tillögu skipaskoðunarstjóra og fengnu samþykki landlæknis veitt undanþágur frá ákvæðum þeim, sem hér greinir.

12. gr.

Brot gegn lögum þessum varða refsingu samkvæmt ákvæðum XI. kafla laga nr. 50 31. júlí 1959.

13. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 31. gr. laga nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum, öðlast gildi 1. janúar 1967. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 136 28. nóvember 1955 um lyf og lækniáhöld í íslenskum skipum.

Samgöngumálaráðuneytið, 14. nóvember 1966.

Eggert G. Þorsteinsson.

Kristinn Gunnarsson.

Fylgiskjal.**I. LYF**

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Acetfenólísatíntöflur 5 mg Tablettae acetphenolisatini 5 mg Ph. Nord. 63 Tablets of Acetphenolisatine 5 mg <i>Hægðatöflur</i> 1—4 töflur að kvöldi.	50 stk.	0	0	0	1	2
Acetylsalicýltöflur 0,5 g Tablettae acetylsalicylicae 0,5 g Ph. Nord. 63 Tablets of Acetylsalicylic Acid 0.5 g <i>Við gígtarþrautum og höfuðverk</i> 1—3 töflur í senn 3—5 sinnum á dag.	50 stk.	1	2	2	2	4
Adrenalínlausn 0,1% til innstungu Injectabile adrenalini 0,1% Ph. Nord. 63 1 mg/ml adrenalínbasi Injection of Adrenaline (containing 1.82 mg Adrenaline Acid Tartrate equivalent to 1 mg Adrenaline per ml) <i>Við penicillinofnæmi (og losti)</i> 0,5 ml í vöðva eða 1,0 ml undir húð.	glerhylki @ 0,5 ml	0	0	5	5	5
Allýprópýmaltöflur 0,1 g Tablettae allypropymali 0,1 g Ph. Nord. 63 Tablets of Aprobarbital 0.1 g <i>Svefntöflur</i> 1—2 töflur undir svefn.	50 stk.	0	0	0	1	2
Atrópíntöflur 0,25 mg Tablettae atropini 0,25 mg Ph. Nord. 63 Tablets of Atropine Sulphate 0.25 mg <i>Við nýrna- eða gallsteinþrautum og innantökum af eitrunum</i> 2 töflur í senn mest 6 sinnum á dag.	20 stk. 100 stk.	0	0	0	2	0 1
Benzalkónáburður 0,5% Unguentum benzalkoni Ph. Nord. 63 Ointment of Benzalkonium (Benzalkonium Chloride 500 mg Macrogol 3000 38 g Macrogol 400 55.5 g Water 6 g) <i>Smurt í umbúðir á vessandi sár</i>	túpur @ 25 g	1	1	1	2	3

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Benzalkónlögur 10% til þynningar	100 ml	1	0	0	0	0
Diluendum benzalkoni 10% Ph. Nord. 63	300 ml	0	1	1	2	3
Solution of Benzalkonium Chloride 10% w/w 10 ml (1 barnaskeið) í 1 l vatns						
<i>Sóttþreinsunarlögur</i>						
Má ekki nota með sápu.						
Benzín, hreinsað	100 ml	1	1	1	2	3
Benzinum medicinale Ph. Nord. 63						
Light Petroleum						
<i>Til húðþreinsunar til að losa heftiplástur o. fl.</i>						
Bibrókatól augnsmyrsl 5%	túpa @ 10 g	0	1	1	2	2
Oculentum bibrocatholi Ph. Nord. 63						
Eye Ointment of Bibrocathol 5%						
<i>Augnsmyrsl</i>						
1—2 sinnum eftir að aðskotahlutur hefur verið fjarlægður, og oft á dag við hvarmabólgu.						
Brennsluspritt	300 ml	1	1	2	2	4
Spiritus denaturatus Á.T.V.R.						
Denaturated spirit (The Government of Iceland Wine Monopoly)						
<i>Til húðþreinsunar</i>						
Brjóstdropar með ópíum	100 ml	0	2	2	5	10
Liquor pectoralis benzoicus cum glycerolo DD 63						
<i>Hóstasaft handa fullorðnum</i>						
1 teskeið í senn 3—5 sinnum á dag.						
Cedilanid Desacetyl, Sandoz	glerhylki @ 2 ml 6 stk.	0	0	0	1	2
Stungulyf 0,2 mg/ml						
Injection of Cedilanid Desacetyl 0.2 mg/ml						
<i>Notist aðeins eftir læknisráði til að örva hjartað í hjartveikum</i>						
DDT-Dísulfíram-Benzýlbenzóatáburður*	100 ml	0	0	0	5	10
Liniment containing: Dicophane 0.5 g Disulfiram 2 g Benzyl Benzoate 20 g Emulsifying agents and Water to 100 g						
<i>Útvortis gegn höfuðlús og flatlús</i>						
Sjá lækningakver.						
DDT-Pýretrín						
Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sóttþreinsunar						
<i>Til úðunar gegn flugum og öðrum skorkvikindum</i>						
Sjá lækningakver.						

*) Sjá forskrift aftan við listann.

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
DDT-stráduft (Lúsaduft)	strábaukar	0	1	2	2	2
Conspergens chlorphenotani Ph. Nord. 63	@ 50 g					
Dusting-powder of Dicophane (Dicophane 5 g Light Kaolin to 100 g)						
<i>Sáldrist í rúmföt og fatnað gegn lús</i>						
Dixantógen-vasilín 10%	100 g	0	0	0	2	2
Vaselinum dixanthogeni Ph. Nord. 63						
<i>Áburður gegn kláðamaur</i>						
Efedrínnefdropar 1%	10 g	0	0	0	3	3
Rhinoguttæ ephedrini Ph. Nord. 63						
Nasal Drops of Ephedrine Hydrochloride 1%						
<i>Nefdropar við stíflu og nefkvefi</i>						
1—4 dropar í hvora nös.						
Efedrínþöflur 20 mg	100 stk.	0	0	0	1	2
Tablettæ ephedrini 20 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Ephedrine Hydrochloride 20 mg						
<i>Við astma</i>						
1—2 töflur 3svar sinnum á dag.						
Emetínvismútjodíðtöflur 60 mg BP 63	100 stk.	0	0	0	0	1
Tablets of Emetine and Bismuth Iodide 60 mg BP 63						
<i>Notist eftir læknisráði við amöbublóðkreppusótt</i>						
Enhexýmaltöflur 0,25 g	20 stk.	0	0	1	2	2
Tablettæ enhexymali 0,25 g Ph. Nord. 63						
Tablets of Hexobarbital 0.25 g						
<i>Við svefnleysi</i>						
1 tafla undir svefn.						
Ergómetrínþöflur 0,5 mg	10 stk.	0	0	0	1	2
Tablettæ ergometrini 0,5 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Ergometrine Maleate 0.5 mg						
<i>Við blæðingu eftir fósturlát</i>						
1—2 töflur í senn. Sjá lækningakver.						
Evflavínþöflur (Hálstöflur)	20 stk.	1	2	3	3	3
Tablettæ euflavini Ph. Nord. 63						
Throat Tablets of Euflavine 3 mg						
<i>Við hálsbólgu eða bólgu í munn.</i>						
1 tafla í senn látin renna í munn.						
Fenemaltöflur 15 mg	100 stk.	0	0	1	2	2
Tablettæ phenemali 15 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Phenobarbitone 15 mg						
<i>Róandi töflur</i>						
1—2 töflur 1—3 á dag.						

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Gigtaráburður Ungventum mentholi compositum DD 63 Ointment containing: Camphor 10 g Menthol 10 g Methyl Salicylate 25 g White Beeswax 18 g and Wool Fat 37 g <i>Við gigtarverkjum</i> Núist vel inn í hörundið 1—2 sinnum á dag.	túpa @ 30 g	0	1	2	2	3
Glýceról (Glýcerín) Glycerolum Ph. Nord. 63 2—3 dropar til að losa eyrnamerg Dælt með glýcerínsprautu upp í endabarm- inn við harðlífi (15—20 ml)	100 ml	0	0	1	2	3
Glýcerýlnítrattöflur 0,5 mg (Nítróglýcerint.) .. Resoriblettae glyceryli nitratis 0,5 mg Ph. Nord. 63 Tablets of Glyceryl Trinitrate 0.5 mg <i>Við hjartakveisu</i> 1—2 töflur í senn látnar renna undir tungu	50 stk.	0	0	1	2	4
Gylliniáburður „F 99“ Algan Diva „F 99“ Algan Diva unguentum Haemorrhoidal ointment <i>Við gylliniæð</i>	túpa @ 40 g	0	1	1	2	3
Gyllinistautar með benzókaíni Suppositoria benzocaini composita Ph. Nord. 63 Suppositories containing Balsam of Peru 0.1 g Benzocaine 0.2 g Bismuth Oxiodogallate 0.2 g and Zinc Oxide 0.5 g <i>Við gylliniæð</i> 1 stautur í senn í endabarm.	5 stk.	0	1	1	2	3
Handáburður I Ungventum dermotheli DD 63 Hand Ointment	túpa @ 25 g	1	2	2	4	4
Handáburður II Ungventum glyceroli Ph. Nord. 63 Hand Ointment	túpa @ 25 g	1	2	2	4	4
Hýdrókortísón vatnsleysanlegt 100—125 mg til innstungu Solu-Cortef, Upjohn eða tilsvareandi lyf Hydrocortisone, water soluble for injections <i>Við losti vegna ofnæmis, meiðsla, bruna eða blæðinga</i> Sjá lækningakver.	1 hettuglas @ 100—125 mg + lausnarvökvi	0	0	2	3	3
Hýdrókortísónsmysl 1% Unguentum hydrocortisoni Ph. Nord. 63 Hydrocortisone Ointment 1% <i>Áburður við exemi</i> 1—2 á dag Sjá lækningakver.	túpa @ 20 g	0	0	1	2	3

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Iktammól Ichthammolum Ph. Nord. 63 Ichthammol <i>Útvortis við exemi</i> Sjá lækningakver.	túpa @ 10 g	0	0	0	2	2
Insúlin Rapitard, Novo* Injectabile insulini Rapitard Novo 40 i.e./ml <i>Við sykursýki til inndælingar undir húð</i> Notist aðeins eftir fyrirsögn læknis Sjá lækningakver.	hettuglas @ 10 ml	0	0	0	2	2
Joðáburður 5% Spiritus jodi 5% Ph. Nord. 63 Solution of Iodine (Iodine 5 g Potassium Iodide 3.5 g Water 8.5 g Alcohol 93% w/w 83 g) <i>Til sóttþreinsunar á hörundi</i>	50 ml	1	1	1	2	3
Kalíumjodíð Kalii jodidum Ph. Nord. 63 Potassium Iodide Glasið fyllist af vatni <i>Slímlosandi hóstalyf</i> 1 teskeið 3–6 sinnum á dag.	10 g í 300 ml glasi	0	0	1	2	2
Karbrómaltöflur 0,5 g Tabletæ carbromali 0,5 g Ph. Nord. 63 Tablets of Carbromal 0,5 g <i>Róandi töflur</i> ½–1 tafla 3svar á dag.	20 stk.	0	0	1	2	3
Klóramfeníkólaugndropar 0,5% Oculoguttæ chloramphenicoli Ph. Nord. 63 Chloramphenicol Ophthalmic Solution 0.5% <i>Við bólgu í augum</i> Nokkrir dropar í senn 3–6 sinnum á dag Sjá lækningakver.	10 ml í sérstöku hettuglasi með tilheyrandi pipettu	0	0	1	2	3
Klóramfeníkólaugnsmyrslí 1% Oculentum chloramphenicoli Ph. Nord. 63 Eye Ointment of Chloramphenicol 1% <i>Við bólgu í augum</i> Sjá lækningakver.	túpa @ 10 g	0	1	2	3	5
Klóramfeníkóltöflur 0,25 g Tabletæ chloramphenicoli 0,25 g Ph. Nord. 63 Tablets of Chloramphenicol 0.25 g <i>Við ýmsum sýklasjúkdómum</i> Notist aðeins eftir læknisráði.	25 stk.	0	0	0	2	4

*) Geymist í kælikistu, en má þó ekki frjósa.

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Klóramin						
Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sótthreinsunar						
<i>Til sótthreinsunar</i>						
1 matskeið af duftinu leysist upp í 1 lítra af vatni.						
Klórórántöflur 0,25 g	100 stk.	0	0	0	2*	5*
Tabletæ chlorochini phosphatis 0,25 g						
Tablets of Chloroquine Phosphate 0.25 g						
<i>Malariulyf</i>						
Fyrst 4 töflur í einu og 6 klst. síðar 2 töflur						
Á 2. og 3. degi 2 töflur á dag						
Sjá lækningakver.						
Klórprómazínlausn 25 mg/ml til innstungu ..	Ampínur	0	0	0	10	10
Injectabile chlorpromazini 25 mg/ml Ph. Nord. 63						
Injection of Chlorpromazine Hydrochloride 25 mg/ml						
<i>Sefandi lyf við geðveiki og drykkjuæði</i>						
<i>(delirium)</i>						
2 ml dælt inn í vöðva						
Sjá lækningakver.						
Klórprómazíntöflur 25 mg	50 stk.	0	0	0	1	2
Tabletæ chlorpromazini 25 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Chlorpromazine Hydrochloride 25 mg						
<i>Sefandi lyf við geðveiki og ofsaköstum</i>						
1—2 töflur 3svar á dag						
Sjá lækningakver.						
Klyasma, einnota	5 ml	0	0	3	6	9
Microlax Asa eða tilsvarendi						
<i>Við hægðatregðu</i>						
1 túpa tæmd inn í endabarminn Verkar eftir 15—20 mínútur						
Sjá lækningakver.						
Ath.!						
Kódeíntöflur 25 mg	20 stk.	0	0	1	0	0
Tabletæ codeini 25 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Codeine Phosphate 25 mg.						
<i>Við sársauka og sárum þurrum hósta</i>						
1—2 töflur í senn mest 3svar á dag.						
Kódimagnýltöflur	50 stk.	1	1	2	0	0
Tabletæ codimagnyli DD 63						
Tablets containing Codeine Phosphate 10 mg Acetylsalicylic Acid 0.5 g and Heavy Magnesium Oxide 70 mg						
<i>Verkjatöflur</i>						
1—3 töflur 1—3svar sinnum á dag.						

*) Viðbót, þegar siglt er til malaríusvæða.

	Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
			1	2	3	4	5
Kolakyrni og natríumsúlfat	10 g + 30 g	1	1	1	2	2
	Granulatum carbonis et natrii sulfas Ph. Nord. 63						
	Granules of Charcoal and Powdered Sodium Sulphate						
	<i>Við ýmsum eitrunum</i>						
	1 skammtur í ½ glas af vatni						
	Sjá lækningakver.						
Kolatöflur 0,25 g	100 stk.	0	0	1	1	2
	Tablettae carbonis Ph. Nord. 63						
	Tablets of Charcoal 0.25 g						
	<i>Við iðrakveisu og niðurgangi</i>						
	3—10 töflur oft á dag.						
Kresólsápulögur (Lýsól)						
	Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sóttþreinsunar.						
	<i>Til sóttþreinsunar</i>						
	1 matskeið í 1 lítra af vatni.						
Krystalfjólubláttspirtt 0,5%	100 ml	0	0	1	2	2
	Spiritus methylosanilini Ph. Nord. 63						
	Solution of Crystal Violet (Crystal Violet 0.5 g						
	Alcohol 61% w/w 50 g Water 49.5 g)						
	<i>Við sveppasjúkdómum í húð</i>						
Lanatósið til innstungu						
	Sjá Cedilanid Desacetyl						
Lanatósiðtöflur 0,25 mg	50 stk.	0	0	0	1	2
	Tablettae lanatosidi 0,25 mg Ph. Nord. 63						
	Tablets of Lanatoside C 0.25 mg						
	<i>Til að örva hjartað</i>						
	1 tafla í senn 3svar á dag Sjá lækningakver.						
Laxerolía	100 ml	0	1	1	2	2
	Oleum ricini Ph. Nord. 63						
	Castor Oil						
	<i>Hægðalyf</i>						
	2—3 matskeiðar í senn						
	Notist alls ekki ef nokkur grunur er um botnlangabólgu!						
Lídókáinaugndropar						
	Sjá Líðókáinlausn 1% með adrenalíni						
	<i>Til staðdeyfingar á slímhúð í augum og nefi</i>						
Lídókáinlausn 1% með adrenalíni til staðdeyfinga	hettuglas @ 20 ml	0	0	2	2	2
	Injectabile lidocain-adrenalini 1% Ph. Nord. 63						
	Injection of Lignocaine Hydrochloride 1% w/v with Adrenaline 5 micrograms/milliliter						
	<i>Innstunguvökvi til staðdeyfingar</i>						

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Magnesiumsilikattöflur 0,5 g	50 stk.	0	1	2	2	3
Tabletæe magnesii silicatis 0,5 g Ph. Nord. 63						
Tablets of Magnesium Trisilicate 0.5 g						
<i>Við brjóstsviða</i>						
2—6 töflur oft á dag — Tyggist.						
Magnýltöflur	50 stk.	1	2	0	0	0
Tabletæe magnyli Ph. Nord. 63	100 stk.	0	0	2	2	4
Tablets containing Acetylsalicylic Acid 0.5 g and Heavy Magnesium Oxide 70 mg						
<i>Við verkjum</i>						
1—3 töflur í senn 3—5 sinnum á dag.						
Merkimiðar (auðir)	10 stk.	0	2	3	4	5
Mexaformtöflur, Ciba	100 stk.	0	0	0	1	2
Mexaform Tablets Ciba						
<i>Við niðurgangi, matareitrun og iðrakvefi</i>						
1—2 töflur í senn 3svar á dag Sjá lækningakver.						
Ath.!						
Morfínláusn 2% til innstungu	Ampínur	0	6	6	12	24
Injectabile morphini 2% Ph. Nord. 63	@ 1 ml					
Injection of Morphine Hydrochloride 2% w/v						
<i>Við miklum þrautum</i>						
1 ampín undir húð eftir læknisráði						
Sjá lækningakver.						
Ath.!						
Morfíntöflur 10 mg	20 stk.	0	0	0	1	2
Tabletæe morphini 10 mg Ph. Nord. 63						
Tablets of Morphine Hydrochloride 10 mg						
<i>Við miklum þrautum</i>						
1 tafla í senn mest 3svar á dag						
Sjá lækningakver.						
Niketamíðláusn 0,25 g/ml (25%) til innstungu	Ampínur	0	0	0	5	10
Injectabile nicethamidi 0,25 g/ml Ph. Nord. 63	@ 2 ml					
Injection of Nicethamide 25% w/v						
<i>Við losti til að örva hjartað</i>						
1 ampín undir húð 2—3svar á dag						
Nítróglyceríntöflur						
Sjá Glycerýlnítrattöflur.						
Noscapíntöflur 25 mg	20 stk.	0	1	2	0	0
Tabletæe noscapini 25 mg Ph. Nord. 63	100 stk.	0	0	0	1	2
Tablets of Narcotine Hydrochloride 25 mg						
<i>Við hósta</i>						
1—2 töflur í senn, mest 3svar á dag.						

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Ath.!						
Ópíumtöflur 50 mg	10 stk.	0	1	2	0	0
Tablettae opii 50 mg	50 stk.	0	0	0	1	2
Tablets of Powdered Opium 50 mg						
<i>Við þrautum, iðrakveisu og niðurgangi</i>						
1 tafla 2—3svar á dag Sjá lækningakver.						
Penicillín til innstungu	1 megaeining	0	0	0	10	20
Penicillinum ad injectionem Ph. Nord. 63	+ lausnarvökvi					
Benzylpenicillin + Water for injection	í einnota dælu					
<i>Við igerðum og ýmsum öðrum sýkla-</i>						
<i>sjúkdómum</i>						
Duftið skal leya í vökvanum.						
Penicillínprókain 600.000 a. e. til innstungu ..	í einnota dælu	0	0	10	15	20
Benzylpenicillinprocaïnum ad injectionem 600.000 i.e.						
Procaine Penicillin Injection 600.000 Units						
<i>Við lungnabólgu, lekanda, sýfilis, fingur-</i>						
<i>meini og ýmsum öðrum sýklasjúkdómum</i>						
1—2 einnota sprautur í vöðva á dag.						
Penicillintöflur ca. 500.000 a. e.	10 stk.	0	2	4	10	15
Tablettae phenoximethylpenicillini 0.32 g Ph. Nord.						
63						
Tablets of Phenoxymethylpenicillin Potassium 0.32 g						
<i>Við igerðum og ýmsum sýklasjúkdómum</i>						
1—2 töflur 3svar á dag.						
Sjá lækningakver.						
Pokar. Hvítir pappírspokar undir lyf	50 stk.	0	1	1	1	1
ca 6 × 11 cm.						
Prófappír fyrir eggjahvítu í þvagi	1 pakkning	0	0	0	1	1
Með áprentaðri notkunarfyrisögn Litast grænn eða						
grænblár ef vættur með þvagi sem inniheldur						
eggjahvítu.						
Prófappír fyrir sykri í þvagi	1 pakkning	0	0	0	1	1
Með áprentaðri notkunarfyrisögn Litast blár eftir						
1 mínútu ef sykur er í þvagi.						
Prógvaniltöflur 0,1 g	100 stk.	0	0	0	1*	5*
Tablettae proguanili chloridi 0,1 g						
Tablets of Proguanil Hydrochloride 0.1 g						
<i>Við malaríu</i>						
1—2 töflur 3svar á dag Sjá lækningakver.						
Salicíylvasilín 2%	túpa @ 50 g	0	1	2	2	2
Vaselinum salicylicum 2%						
Salicylic Acid 2 g Yellow Soft Paraffin 98 g						
<i>Áburður á þurra og skorpna húð</i>						

*) Viðbót, þegar siglt er til malaríusvæða.

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Salttöflur, samsettar	100 stk.	0	0	**1	**2	**5
<p>Áletrist upplýsingum um innihald hvernar töflu, ásamt „Í hitabeltinu takist 2 töflur með hverri máltíð“ auk „Tyggist ekki“ Tablettae natrii chloridi compositae obductae enterosolubiles Tablets containing: Calcium Carbonate 18 mg Potassium Chloride 30 mg Sodium Chloride 450 mg Dextrose 200 mg <i>Við salt- og vökvamissi í miklum hitum</i> 2 töflur með hverri máltíð.</p>						
Sjóveikisstautar	10 stk.	0	0	1	2	2
<p>Suppositoria diphenhydramini chloridi 50 mg Suppositories of Diphenhydramine Hydrochloride 50 mg 1 stautur í senn, allt að 4 sinnum á dag.</p>						
Sjóveikistöflur	25 stk.	1	1	2	4	8
<p>Tablettae coffinautini Ph. Nord. 63 Tablets containing: Diphenhydramine Hydrochloride 50 mg and Caffeine 50 mg 2 töflur fyrst síðan 1 tafla mest 4 sinnum á sólarhring.</p>						
Smokkar (Getnaðarverjur karla)	24 stk.	0	1	2	2	2
<p>Condoms</p>						
Sódaduft	250 g	1	1	1	1	1
<p>Natrii bicarbonas Ph. Nord. 63 Sodium Bicarbonate <i>Við brjóstsviða og eitrunum af sýrum</i> ½—1 teskeið í vatni, mest 3svar sinnum á dag.</p>						
Súlfakombintöflur 0,5 g	100 stk.	0	0	1	2	4
<p>Tablettae sulfacombini 0,5 g Ph. Nord. 63 Tablets containing: Equal Amounts of Sulphadiazine Sulphadimidine and Sulphamerazine <i>Við ígerðum og ýmsum öðrum sýkla-sjúkdómum</i> 8 töflur fyrst síðan 2 töflur á 6 klukkustunda fresti Sjá lækningakver.</p>						
Súrefni í hylkjum sérstaklega ætlað til innöndunar	minnst 5 kg í súrhylki	0	0	0	1	1
<p>Oxygenium Ph. Nord. 63 <i>Til innöndunar í hjarta- og lungnasjúkdómum svo og við lífgun</i></p>						
Súrvatn	100 ml	0	1	1	2	2
<p>Solutio hydrogenii peroxidi 3% Ph. Nord. 63 Solution of Hydrogen Peroxide 3% w/w <i>Til að skola óhrein sár</i></p>						

**) Viðbót, þegar siglt er í miklum hitum eða hitabelti.

	Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
			1	2	3	4	5
Talýlsúlfatiazóltöflur 0,5 g	100 stk.	1	1	1	2	2
Tablettaa phthalylsulfathiazoli 0,5 g Ph. Nord. 63							
Tablets of Phthalylsulphathiazole 0.5 g							
<i>Við niðurgangi</i>							
2—3 töflur í senn á 4—6 tíma fresti.							
Tanndropar	10 g	0	1	1	2	3
Mentholum 10 g chlorali hydras 10 g cincainum 1 g							
Menthol 10 g Chloral Hydrate 10 g Cinchocaine 1 g							
<i>Í holu í tönn við tannpinu</i>							
Tetracyklíntöflur 250 mg	16 stk.	0	0	0	2	4
Tablettaa tetracyclini 250 mg Ph. Nord. 63 eða til-							
svarandi lyf							
Tablets of Tetracycline Hydrochloride 250 mg							
<i>Við ýmsum sjúklasjúkdómum</i>							
1—2 töflur 4 sinnum á dag Sjá lækningakver.							
Tetrakainflögur 0,25 mg	10 stk.	0	0	1	1	2
Lamellae of Amethocaine Hydrochloride 0.25 mg							
<i>Til staðdeyfingar í auga</i>							
1 flaga sett undir neðra augnalok Sjá lækningakver.							
Tópicínsmyrslí	túba @ 25 g	1	1	1	3	5
Unguentum topicini Ph. Nord. 63							
Ointment containing: Neomycine Sulphate 0.5 g							
Bacitracin 1 g Wool Fat 10 g and Yellow Soft							
Paraffin 88.5 g							
<i>Við bruna, sárum og kaunum</i>							
Tópicínstráduft	strábaukur 10 g	1	1	1	3	5
Conspersgens topicini Ph. Nord. 63							
Dusting Powder containing: Neomycine Sulphate							
0.25 g Bacitracin 0.5 g Sterilized Absorbable Starch							
Powder 99.25 g							
<i>Í sár, fleiður og afrifur</i>							
Vasilín, sæft	túba @ 25 g	1	2	5	5	5
Vaselinum sterilisatum DD 63							
Yellow Soft Paraffin sterilized							
<i>Við sárum og húðsjúkdómum</i>							
Vismút-magnésíum-duft	50 g	0	0	4	4	8
Pulvis bismuthi antacidus Ph. Nord. 63							
Powder containing: Sodium Bicarbonate 15 g Bis-							
muth Carbonate 25 g Light Magnesium Carbonate							
30 g Magnesium Trisilicate 30 g							
<i>Við magabólgu og magasári</i>							
1 sléttfull teskeið í vatni með máltíð 3svar á dag.							

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Vismúttöflur (Stoppandi töflur)	20 stk.	0	1	0	0	0
Tablettaa bismuthi 0,5 g Ph. Nord. 63	50 stk.	0	0	1	2	3
Tablets of Bismuth Salicylate 0.5 g						
<i>Við niðurgangi</i>						
1—3 töflur í senn.						
Vítissteinsaugndropar handa nýfæddum*	10 ml í sérstöku					
Oculoguttæ argenti nitratis pro neonatis DD 63	hettuglasi ásamt					
Silver Nitrate Ophthalmic Solution (Silver Nitrate	tilheyrandi					
0.67% Potassium Nitrate 1.20% in Water for in-	pípettu					
jection)						
1—2 dropar í auga nýfædds barns eftir að það hefur						
verið laugað.						
Zinkáburður	300 ml	0	0	1	2	3
Linimentum zinci Ph. Nord. 63						
Liniment containing: Zinc Oxide 12.5 g Talc 12.5 g						
Glycerin 12.5 g Alcohol 61% w/w 12.5 g Distilled						
Water 50 g						
<i>Við ýmsum húðsjúkdómum (helzt á</i>						
<i>hárlausa húð)</i>						
Sjá lækningakver.						
Zinkaugndropar með bórsýru	10 ml í sérstöku	0	0	1	2	2
Oculoguttæ zinci Ph. Nord. 63	hettuglasi ásamt					
Ophthalmic Solution of Zinc Sulphate 0.35 g Boric	tilheyrandi					
Acid 1.75 g Water for Injection 97.9 g	pípettu					
<i>Við þroti í augum</i>						
2 dropar í auga í senn						
Zinkpasta mjúkur	túpa @ 25 g	1	1	1	2	3
Pasta zinci mollis DD 63						
Zinc Oxide 30% in Yellow Soft Paraffin						
<i>Við afrifum</i>						
Zinkstráduft	strábaukur	0	0	1	2	3
Conspersgens zinci Ph. Nord. 63	@ 100 g					
Dusting-powder of Zinc Oxide and Talc (Zinc Oxide						
10 g Talc 90 g)						
<i>Á vessandi húð</i>						

*) Skulu vera í fæðingarböggli.

Viðbætur við lyfjalista.

DDT-Dísúlfíram-Benzýlbenzóat-áburð skal gera þannig:

I	{	Chlorphenotanium	5 g
		Disulfíramum	20 -
		Benzýli benzoas	200 -
		Monostearinum	30 -
		Acidum stearicum	20 -
II	{	Triaethanolaminum	5 -
		Aqua purificata	720 -
			1000 g

I blandist við vægan hita. Trietanólamiðið leysist í vatninu.

I og II er blandað saman og sett í emúlsíons-vél.

Áætlað geymsluþol 1 ár.

II. EFNI TIL SÓTTBREINSUNAR

(Geymist sérstaklega afstúkað)

Heiti	Eining	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
DDT-Pýretrín	Úðahylki ca: 500 g	0	0	0	0	0
(t. d. Esso Flit eða Radar Universal) Til þess að eyða flugum og öðrum skordýrum.						
Klóramín	500 g	0	0	1	2	4
Chloraminum Ph. Nord. 63 Chloramine Til sóttbreinsunar Sjá lækningakver.						
Kresólsápulögur (Lýsól)	250 g	1	2	0	0	0
Kresolum saponatum Ph. Nord. 63 Til sóttbreinsunar Sjá lækningakver.	1000 g	0	0	1	2	4
Þiochlór eða svipað efni með ca. 70% virku klóri	1000 g	0	0	0	0	0
Dry preparation containing approximately 70 per cent chlorine for water disinfection Til klórunar á drykkjarvatni.						

III. UMBÚÐIR OG HJÚKRUNARGÖGN

Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Augnbaðglas Eye bath		1	1	1	1	1
Augnleppur (satín) Eye shade		0	0	1	1	1
Baðmull, óþerrin Non-Absorbent Cotton-wool	ca: 125 g	0	0	2	2	2
Baðmullarpinnar (Tréþinnar með baðmull) .. Throat Swab	50 stk.	0	0	1	1	1
Dreypigler með gúmbelg Eye dropper with Rubbercap		0	1	2	2	2
Eyrnadæla úr gúmi Ear-syringe	ca: 100 ml	0	0	1	1	1
Fetill, þrihyrndur Arm Sling		1	1	2	3	4
Flónelsbindi Flannel Bandages	ca: 5 m × 7 cm	0	1	1	2	2
Fæðingarböggull er innihaldi 1 Nélatons þvaglegg, 2 skæri 13 cm löng, 3 baðmullarþræði, 1 naflabindi sæft og 1 glas vítissteinsaugndropa handa nýfæddum, sjá lyf I Parcel for child birth containing: 1 Nélaton catheter, 2 scissors, 3 pieces of cotton thread, sterile surgical dressing for navel, a bottle of silver nitrate ophthalmic solution, see grup I		0	0	1*	1*	1*
Glýceríndæla Glycerin ointment	ca: 15 ml	0	0	1	1	1
Gúmhanzkar, sæfðir Surgeons Gloves	8—8½	0	0	0	2	2 pör pör

*) Í farþegaskipum.

Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Hitapoki úr gúmi Hot-water Bottle		0	0	1	2	2
Hægðaskál (ryðfrítt stál) Bed-pan		0	0	1	1	1
Íspoki Ice-bag		0	0	0	0	0
Lásnælur (ryðfrítt stál) Safety-pins	12 stk. nr. 4	1	1	1	2	3
Leguhringur Air Cushion	ca: 42 cm þvermál	0	0	0	1	1
Léreftsbindi Linen cloth-bandages	ca: 5 m × 7 cm	0	1	1	2	2
Lyfjastaup Graduated Medicine Glass		0	1	1	1	1
Magaslanga með trekt og 1¼ m af gúmslöngu Gastric Lavage Tubing	ca: 9 mm í þvermál	0	0	1	1	1
Naglabursti, er þolir suðu Nail-brush		0	2	2	2	2
Naglaskafa úr málmí Nail Cleaner		0	2	2	2	2
Nefleggur til súrefnisgjafar Oxygen Catheter		0	0	0	1	1
Nýrnaskál (ryðfrítt stál) Kidney Bowl		0	0	0	1	1
Plastdúkur Plastic Foil	1 m ²	0	0	0	1	1
Plasthanzkar einnota Plastic Disposable Exploration Gloves	12 stk.	0	0	0	1	1
Plástur, heftiplástur Adhesive Plaster	ca: 5 m × 5 cm	0	1	2	2	3
Plástur, skyndiplástur ca: ½ m × 4 cm ca: ½ m × 6 cm	ca: ½ m × 4 cm	1	2	3	3	6
	ca: ½ m × 6 cm	1	2	3	3	6
Plástur, teygjuplástur Tensoplast	ca: 5 m × 2½ cm	0	1	2	3	5
	ca: 5 m × 8 cm	0	0	0	2	2

Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Pungbindi Suspensory Bandage	ca: nr. 5	0	0	0	1	2
Sáralín, sæft Gauze sponges	böggull með 10 stk. ca: 20 cm × 20 cm samanbrotið	0	1	1	2	4
Sáralinsbindi sæfð (32 þráða) Gauze-bandages	ca: 5 m × 3 cm	2	5	5	10	20
Sáralinsbindi sæfð (32 þráða) Gauze-bandages	ca: 5 m × 5 cm	2	5	5	10	20
Sáralinsbindi sæfð (32 þráða) Gauze-bandages	ca: 5 m × 7 cm	2	5	5	10	20
Sjúkrabaðmull þerrin, felld Absorbent Cotton-wool	50 g	1	2	5	10	15
Sjúkrabaðmull, þerrin, sæfð Sterilized Absorbent Cotton-wool	20 g	1	2	2	5	10
Sjúkradúkur úr gúmbornu líni eða annar jafnhæfur dúkur Rubber-linen Bed Sheeting	ca: 0,9 × 1,5 m	0	0	1	1	2
Skinneglur, misstórar Finger stalls		2	3	3	5	5
Skolkanna með slöngu og harðgúmstút með hana		0	0	1	1	1
Slöngugrisja Tubegauz Scholl Mfg. Co.	nr. 01—25 yds. með „appli- kator“ nr. 1	0	1	2	3	4
Sótthitamælir (í hylki) Clinical Thermometer		0	2	2	2	2
Stútkanna Feeding Cup		0	0	1	1	1
Súrefnistæki (skolflaska, hanar, mælar, leiðslur og gríma) til nota við súrefnisgjöf		0	0	0	1	1
Svöðusárabindi sæfð Standard dressing nr. 14 B.P.C.		2	3	5	10	15

Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Svöðusárabindi sæfð Standard dressing nr. 15 B.P.C.		1	2	3	5	10
Teygjubindi Elastic Bandage	ca: 5 m × 8 cm	1	1	2	3	5
Tunguspaðar úr tré (smyrslspaðar) „Ointment Spatula“	100 stk.	0	0	1	1	1
Vírnetsspelkur Kramers Kramer's Splints	breidd ca. 10 cm	0	0	0	2 m	4 m
Þvagglass (úr gleri) fyrir karla Urinal (Male)		0	0	1	1	1
Þvagleggur Tiemanns, einnota Catheter (disposable)	nr. 16	0	0	2	4	4
Þvagleggur Tiemanns (úr gúmi) Catheter (rubber)	nr. 16	0	0	1	1	1

IV. ÁHÖLD

Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
		1	2	3	4	5
Áhaldasuðukassi með tveim handföngum og rist Instrument Sterilizer	ca: 28×15×9 cm	0	0	0	1	1
Eyrnatöng (Troeltsch) Crossed Ear Forceps	ca: 13 cm	0	0	1	1	1
Flísatöng (Feilchenfeldt) Splitter Forceps	ca: 11 cm	1	1	1	1	1
Hnífur oddhvass Scalpel	ca: 13 cm	0	0	1	2	2
Hnoðratöng (Tampon-töng) Sponge Forceps	ca: 25 cm	0	0	1	1	1
Holmeitill, Horners Horners Gouge		0	0	0	0	0
Holnálar, record Hypodermic needles	nr. 15	0	0	12	12	12
Holnálar, record Hypodermic needles	nr. 12	0	0	12	12	12
Holnálar, record Hypodermic needles	nr. 2	0	0	12	12	12
Koktöng Throat Forceps	ca: 20 cm	0	0	0	1	1
Korntöng bein Dressing Forceps	ca: 14 cm	0	0	0	1	1
Lyfjadæla, einnota Hypodermic Syringes (disposable)	2 ml með holnál	0	0	5	10	10
Lyfjadæla, einnota Hypodermic Syringes (disposable)	5 ml með holnál	0	0	2	5	10

	Heiti	Eining/Stærð	Lyfjakista nr.				
			1	2	3	4	5
Lyfjadæla, einnota	Hypodermic Syringes (disposable)	10 ml með holnál	0	0	0	5	10
Lyfjadæla, record, iso 200°	Hypodermic Syringes	2 ml	0	0	1	2	2
Lyfjadæla, record, iso 200°	Hypodermic Syringes	5 ml	0	0	0	2	2
Málmæla til blöðruskolunar	Bladder Syringe	50 ml	0	0	0	1	1
Nálhaldari (Mayo-Hegar) eða svipaður	Needle-holder	ca: 20 cm	0	0	1	1	1
Sárahaki með fjórum göddum	Wound Retractor	ca: 22 cm	0	0	2	2	2
Sáratöng (Listers)	Listers Forceps	ca: 14 cm	0	1	1	1	1
Saumnálar, bognar, meðalstórar	Surgical Needles		0	0	5	5	5
Saumsilki no 1	Suture Silk (ca: 20 m)	1 kefli	0	0	1	1	1
Saumsilki no 1 með boginni endapræddri nál sæft	Atraumatic Suture	1 hylki	0	0	5	5	5
Skæri, bein, ydd/sljó	Scissors Straight Pointed/Blunt	ca: 13 cm	1	1	2	2	2
Skæri, hliðbogin (Coopers), ydd/sljó	Scissors Coopers Pointed/Blunt	ca: 13 cm	0	0	1	1	1
Skæri, umbúðaskæri (Esmarchs)	Bandage Scissors Esmarchs	ca: 20 cm	0	0	1	1	1
Speculum (Collins)			0	0	0	0	0
Tanntöng, Lindhards eða jafngóð	Universal Tooth Extraction Forceps	ca: 18,5 cm	0	0	1	1	1
Vefjatöng (pincetta) hakalaus	Dressing Forceps	ca: 13 cm	0	1	1	1	2
Vefjatöng (pincetta) með hökum	Tissue Forceps	ca: 13 cm	0	1	1	1	2
Æðatöng (Pean's)	Haemostatic Forceps	ca: 13 cm	0	0	4	4	4

Lyfjakista nr. 6

Lyfjakista nr. 6 er ætluð í björgunarbáta, björgunarfleka og gúmbjörgunarbáta. Í þessum björgunarförum skal vera 1 slík lyfjakista fyrir hverja 12 menn, sem ætlað er rúm fyrir.

I. Lyf.

Ath.!

Amfetamíntöflur 5 mg 1 × 25 stk.

Tablettaa amphetamini 5 mg Ph. Nord. 63

Benzalkónáburður (Bakteríudrepanði áburður) 1 × 25 g í túpu

Ungventum benzalkoni Ph. Nord. 63

Dífenhýdramíntöflur 50 mg (Sjóveikistöflur) 2 × 25 stk.

Tablettaa diphenhydramini 50 mg Ph. Nord. 63

Kódfíntöflur (Verkjatöflur) 1 × 25 stk.

Tablettaa codipheni Ph. Nord. 63

Ath.!

Morfínlausn 2% til innstungu 1 × 6 ampínur @ 1 ml

Injectabile morphini 2% Ph. Nord. 63

II. Hjúkrunargögn og áhöld.

Fetill (Mitella) með áprentuðum leiðbeiningum 4 stk.

Lásnælur nr. 4 (ryðfrítt stál) 12 stk.

Plástur, teygjuplástur 1 m × 2½ cm 1 stk.

Sáralínsbindi, sæfð, 32 þráða, 5 m × 8 cm 5 stk.

Skyndiplástur (sáraplástur), 10 cm × 6 cm 10 stk.

Skæri, hvöss/sljó, ca. 13 cm (ryðfrítt stál) 1 stk.

Svöðusárabindi, Standard dressing nr. 14 B. P. C. 2 stk.

Svöðusárabindi, Standard dressing nr. 15 B. P. C. 2 stk.

III. Prentaðar leiðbeiningar um hjálp í viðlögum.

Leiðbeiningar um notkun lyfja í björgunarflekum.

1. Morfín er í ampínunum til innstungu undir húð. Ráðlegast er að stinga í læri utanvert. Lesið leiðbeiningarnar á umbúðunum.
Morfín er gefið við miklum verkjum.
Börnum má ekki gefa morfín.
Gefa skal fullorðnum 1 ampín á 6—8 klukkustunda fresti.
2. Amfetamíntöflur verka örvandi og draga úr svefnhöfði. Gefa má eina töflu á sólarhring, en þó ekki síðustu 2 stundir áður en lagzt er til svefns.
3. Dýfenhýdramíntöflur eru gegn sjóveiki.
Gefa má fullorðnum 1 töflu tvisvar á sólarhring, en börnum $\frac{1}{2}$ töflu tvisvar á sólarhring.
4. Kódifentöflur eru við verkjum.
Gefa má tvær töflur í senn þrisvar á sólarhring.
5. Benzalkónáburður er bakteríudrepandi sáraáburður.
Bera má áburðinn á sár og í nánd eða á sáralín (kompresu), sem er lagt við sár.

Stutt leiðsögn í hjálp í viðlögum.

1. Meðferð svöðusára.

Blætt getur úr sárum og ígerð komið í þau. Oftast má stöðva blæðingu úr sárum með því að þrýsta þeim saman. Ef sár er á útlimum, má stöðva blæðingu með því að lyfta limnum.

Berið benzalkonsmyrsl á sárið og leggið á það saraklæði nr. 14 eða 15 (Standard Dressing nr. 14 eða 15). Festið klæði með grisjubindi úr umbúðarbögglinum. Herðið á grisjubindinu, ef sárið blæðir. Herzluna má auka með því að skjóta litlum hlut úr málm, eldspýtnastokk eða öðru, sem handbært er, undir grisjubindið. Látið umbúðirnar óhreyfðar, ef þær herða ekki um of að sárinu. Forðist að hreyfa þann líkamshluta, þar sem sárið er.

Hinn slasaði getur fengið lost. Grábleikur hörundslitur, kalt og þvalt hörund, þurrar varir og hraður hjartsláttur eru einkenni um lost. Beri þetta við skal lækka undir höfði hins slasaða og vefja hann ábreiðum. Hinn slasaði má drekka vatn að lyst sinni, ef hann er við fulla meðvitund.

2. Meðferð brunasára.

Sár eru klædd sem að ofan segir. Grisjubindið á að liggja þétt um saraklæðið, en má þó ekki herða að sárinu. Hinn slasaði liggja kyrr, ef sár hans eru mikil. Gefið honum vatn að drekka, ef hann er með meðvitund.

3. Meðferð beinbrota.

Forðast skal að hreyfa þann líkamshluta, þar sem brotið er. Þetta á eins við, ef sterkur grunur leikur á því, að bein hafi brotnað. Brotinn handlegg á að leggja í fatla. Brotinn fótlegg á að binda með fatla við hinn legginn. Við miklum verkjum er réttmætt að gefa morfín.