

REGLUGERÐ

um (7.) breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og ávísun lyfja, afgreiðslu þeirra og merkingu nr. 421/1988.

1. gr.

Eftirfarandi eru breytingar á viðauka 4 við reglugerðina:

Efni	Hámarks magn og/eða takmarkanir	Dæmi um lyf og lyfjaform, er selja má án lyfseðils	Áletrun og/eða upplýsingar á fylgiseðli, sem afhenda skal með lyfinu.
Hydrocortisonum (gildir eingöngu fyrir alkóhólinn)	Í stað setningarinnar: Lyfjaform til útvortis notkunar o.s.frv. kemur: "Lyfjaform til útvortis notkunar; mest 10 mg/g eða 10 mg/ml (1%). Mest 30 g handa einstaklingi."	Við bætist: MILDISON, krem feitt	
Loperamidum	Mixtúrur, mest 0,2 mg/ml. Mest 100 ml handa einstaklingi.	IMODIUM, mixtúra.	Við bráðum niðurgangi; skammtímameðferð Skammtar: Fullorðnir og börn 12 ára og eldri: 20 ml í upphafi meðferðar. Ekki má taka meira af lyfinu fyrr en að 2-3 klst. liðnum og þá 10 ml í senn eftir þörfum, en aldrei meira en 80 ml á sólarhring. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára án samráðs við lækni. Leitið lækni, ef niðurgangur hefur ekki batnað eftir tveggja daga meðferð. Varúð: Við háan hita eða ef blóð er í hægðum, má ekki nota lyfið. Leitið til lækni.
Loperamidum frh.	Lyfjaform í af mældum skömmtum. Einstakur skammtur mest 2 mg. Mest 16 stk. handa einstaklingi.	IMODIUM, hylki.	Við bráðum niðurgangi; skammtímameðferð. Skammtar: Fullorðnir og börn 12 ára og eldri: 2 hylki í upphafi meðferðar. Ekki má taka meira af lyfinu fyrr en 2-3 klst. liðnum og þá 1 hylki í senn eftir þörfum, en aldrei meira en 8 hylki á sólarhring. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára án samráðs við lækni. Leitið lækni, ef niðurgangur hefur ekki batnað eftir tveggja daga meðferð. Varúð: Við háan hita eða ef blóð er í hægðum, má ekki nota lyfið. Leitið til lækni.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. lyfjalaga nr. 108/1984, öðlast gildi við birtingu.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. júní 1990.

Guðmundur Bjarnason.

Dögg Pálsdóttir.