

	Kr.
Útlánaígildi afleiðusamninga samkvæmt reglum um mat á áhættugrunni	

24. gr.

Reglur þessar, sem settar eru með vísan til 57. gr. og 6. mgr. 66. gr. laga um viðskiptabanka og sparisjóði nr. 43/1993 og 11. gr. laga um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði nr. 123/1993, öðlast þegar gildi og skulu gilda fyrir gerð ársreiknings fyrir reikningsárið 1995. Ákvæði 21. gr. gildir þó fyrst við gerð ársreiknings fyrir reikningsárið 1996.

Seðlabanki Íslands, 29. desember 1995.

Steingrímur Hermannsson.

Þórður Ólafsson.

REGLUGERÐ

um (1.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri.

1. gr.

Við skilgreiningar í 5 gr. reglugerðarinnar bætist:

17. Sérfóður: Fóðurblanda sem vegna efnis- eða eðlisgerðar er frábrugðin bæði venjulegu fóðri og lyfjum og markmið með notkun er að fullnægja sérstökum næringarþörfum.

2. gr.

Við 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar bætast orðin:

... og lýst hefur verið í samræmi við ákvæði tilskipunar 94/40 EB um leiðbeiningar um mat á aukefnum í fóðri.

3. gr.

Aftan við tölulið 2.0 í B-lið IV. kafla reglugerðarinnar komi nýr töluliður, er verði töluliður 3.0 og ber yfirskriftina „Sérfóður“, svohljóðandi:

Krafa til fóðurblandu sem ætluð er til að fullnægja sérstökum næringarþörfum er að notkunarsvið blöndunnar sé í samræmi við næringarmarkmiðið í dálki 1, dýrategund eða hóp, sbr. dálk 3 og einn eða fleiri af þeim eiginleikum í dálki 2 sem tilgreindir eru í töflu 3.1.

Tafla 3.1.

Skrá yfir notkunarvið sérfóðurs:

Sérstök næringarmarkmið	Mikilvægir næringareiginleikar	Tegund eða flokkur dýra	Upplýsingar á merktíðna	Ráðlagður notkumartími	Ömur ákvæði
1	2	3	4	5	6
Stuðningur við nýrnastarfsemi vegna langvinnrar nýrnabilunar (1)	Lágt fosfórinnihald og takmarkað próteininnihald í háum gæðaflokki	Hundar og ketur	<ul style="list-style-type: none"> — Prótingjafi (prótingjafar) — Kalsíum — Fosfór — Kalcíum — Natrium — Innihald mikilvægra fitusýra (sé þeim bætt við) 	Allt að 6 mánuðir til að byrja með (2)	<p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merktíðna:</p> <p>„Ráðlagt er að leita álitis dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkumartími er framlengdur.“</p> <p>Upplýsingar í notkumartíð-beiningum:</p> <p>„Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að vatni.“</p>
Upplausn strúvtæina (2)	<ul style="list-style-type: none"> — Þvagsýringareiginleikar, lágt magnurinnihald og takmarkað próteininnihald í háum gæðaflokki 	Hundar	<ul style="list-style-type: none"> — Prótingjafi (prótingjafar) — Kalsíum — Fosfór — Natrium — Magníum — Kalcíum — Klóríð — Brennisteinn — Þvagsýringarefni 	5 – 12 vikur	<p>Upplýsingar í notkumartíð-beiningum:</p> <p>„Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að vatni.“</p> <p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merktíðna:</p> <p>„Ráðlagt er að leita álitis dýralæknis fyrir notkun.“</p>
	<ul style="list-style-type: none"> — Þvagsýringareiginleikar og lágt magnurinnihald 	Ketur	<ul style="list-style-type: none"> — Kalsíum — Fosfór — Natrium — Magníum — Kalcíum — Klóríð — Brennisteinn — Tárin samtals — Þvagsýringarefni 		

1	2	3	4	5	6
<p>Að draga úr endurmyndun strúvísteina (*)</p>	<p>Pvagsýringareiginleikar og miblungs magnúrninnihald</p>	<p>Hundar og ketur</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Kalsíum — Fosfór — Natríum — Magníum — Kalíum — Klóríð — Brennisteinn — Pwagsýringarefni <p>Prótingjafi (prótingjafar)</p>	<p>Allt að 6 mánuðir</p>	<p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokkun.“</p>
<p>Að draga úr myndun úrasteina</p>	<p>Lágt púrinnihald, lágt prótinnihald í háum gæðaflokki</p>	<p>Hundar og ketur</p>	<p>Prótingjafi (prótingjafar)</p>	<p>Allt að 6 mánuðir; lífstíðar-nokun ef varanleg rökun er á pvagsýrnefnaskiptum</p>	<p>Upplýsingar í notkunarléð-beiningum: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokkun.“</p>
<p>Að draga úr myndun oxalasteina</p>	<p>Lágt kalsíurninnihald, lágt innihald D-vítamíns og efna sem gera pvag basískt</p>	<p>Hundar og ketur</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Fosfór — Kalsíum — Natríum — Magníum — Kalíum — Klóríð — Brennisteinn — D-vítamín samals — Hýdroxýprólin — Efni sem gera pvag basískt 	<p>Allt að 6 mánuðir</p>	<p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokkun.“</p>
<p>Að draga úr myndun systínsteina</p>	<p>Lágt prótinnihald, miblungs innihald brennisteinsamínósýra og efna sem gera pvag basískt</p>	<p>Hundar og ketur</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Brennisteinsamínósýrur samals — Natríum — Kalíum — Klóríð — Brennisteinn — Efni sem gera pvag basískt 	<p>Allt að 1 ár til að byrja með</p>	<p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“</p>
<p>Að draga úr óþoli af völdum innihalds- og næringarefna (*)</p>	<p>— Úrvalsprótingjafi (úrvalsprótingjafar)</p>	<p>Hundar og ketur</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Prótingjafi (prótingjafar) — Innihald málkivegra fitusýra (sé þeim bær við) 	<p>3 – 8 vikur; ef merki um óþol hverfa má nota fókrið í ótakmarkaðan tíma</p>	<p>—</p>

1	2	3	4	5	6
<p>og/öð</p> <p>— Úrvælskolvegisgjafi (úrvalskolvegisgjafar)</p> <p>Aukið innihald rafkleyfra efna og aubmeltanlegra innihaldsefna</p> <p>Aubmeltanleg innihaldsefni og lágt fituinnihald</p> <p>Lágt natríuminnihald og aukið hlutfall K/Na</p> <p>Lágt innihald kolvetna sem breytast hratt í glúkósa</p>	<p>Hundar og ketur</p> <p>Hundar og ketur</p> <p>Hundar og ketur</p> <p>Hundar og ketur</p> <p>Hundar og ketur</p>	<p>— Kolvefnisgjafi (kolvefnisgjafar)</p> <p>— Innihald mikilvægra fitusýra (sé þeim bætt við)</p> <p>— Aubmeli innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á</p> <p>— Natríum</p> <p>— Kalíum</p> <p>— Slimefnagjafar (sé þeim bætt við)</p> <p>Aubmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á</p> <p>— Natríum</p> <p>— Kalíum</p> <p>— Magnítíum</p> <p>— Kolvefnisgjafi (kolvefnisgjafar)</p> <p>— Meðhöndlun kolvetna, ef við á</p> <p>— Sterkja</p> <p>— Heildarsýkurefni</p> <p>— Glúkósi (sé honum bætt við)</p> <p>— Innihald mikilvægra fitusýra (sé þeim bætt við)</p> <p>— Fitusýrugjafi (fitusýrugjafar) með smittri og miðlungslangri kolefnisakeðju</p>	<p>1 – 2 vikur</p> <p>3 – 12 vikur, lífstoðarmokun ef um langvinna braskirtilbilun er að ræða</p> <p>Allt að 6 mánuðir til að byrja með</p> <p>Allt að 6 mánuðir til að byrja með</p>	<p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða:</p> <p>— „Við brjóðum niðurgangi og þær til bata er það.“</p> <p>— „Ráðlagt er að leita állis dýralæknis fyrir notkun.“</p> <p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða:</p> <p>„Ráðlagt er að leita állis dýralæknis fyrir notkun.“</p> <p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða:</p> <p>„Ráðlagt er að leita állis dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“</p> <p>Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða:</p> <p>„Ráðlagt er að leita állis dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“</p>	
<p>Minnkun skyndilegra truflana á uppögi í börnum</p> <p>Mótvægi við mælingartruflanir (¹)</p> <p>Stuðningur við hjartastarfsemi vegna langvinnrar hjartabilunar</p> <p>Stjórnun á glúkósaforða (sykursýki)</p>					

1	2	3	4	5	6
Stuðningur við lífræstarfærni vegna langvinnrar lífrarbilunar	— Prótín í háum gæðaflokki, meðlungs prótínnihald, lágt fituinnihald, hátt innihald mikilvægra fitusýra og hátt innihald aubæltanlegra kolvetna	Hundar	— Prótínjafi (prótingjafar) — Innihald mikilvægra fitusýra — Aubæltanleg kolvetni og meðhöndlun þeirra ef við á — Natrjum — Heildarinnihald kopars	Allt að 6 mánuðir til að byrja með	Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkingböð: „Ráðlagt er að leita álls dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“
Stjórnun á fitnefnaþéttum vegna of hárrar blóðfitu	— Prótín í háum gæðaflokki, meðlungs prótínnihald, hátt innihald mikilvægra fitusýra	Kettir	— Prótínjafi (prótingjafar) — Innihald mikilvægra fitusýra — Natrjum — Heildarinnihald kopars	Allt að 2 mánuðir til að byrja með	Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkingböð: „Ráðlagt er að leita álls dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“
Minnkun á koparinnihaldi í lifur	Lágt fituinnihald og hátt innihald mikilvægra fitusýra	Hundar og kettir	— Innihald mikilvægra fitusýra — Innihald n-3-fitusýra (sé þeim best við)	Allt að 6 mánuðir til að byrja með	Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkingböð: „Ráðlagt er að leita álls dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur.“
Stuðningur við starfsemi húðar vegna húðsjúkdóma og hármáttis	Lágt koparinnihald	Hundar	Heildarinnihald kopars	Allt að 2 mánuðir	Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkingböð: „Ráðlagt er að leita álls dýralæknis fyrir notkun.“
Að draga úr hættu á dóbba	Hátt innihald mikilvægra fitusýra — Lágt kalsíuminnihald	Hundar og kettir Mjólkurkýr	Innihald mikilvægra fitusýra — Kalsíum — Fosfór — Magníum	1 – 4 vikur fyrir burð	Upplýsingar á notkunarlitð-beiningum: „Hættu gjöf efir burð.“

1	2	3	4	5	6
<p>og/eða</p> <p>— Lágt hlutfall bakskauts- /forskaustjóna</p>	<p>Mjólkurkýr og ær</p>	<p>— Kalíum — Fosfór — Natríum — Kalíum — Klóríð — Brennistærinn</p> <p>— Innihaldsefni sem eru orkugjafar í formi glúkósa</p> <p>— Próþan-1,2-díól (sé því bært við sem forefni glúkósa)</p> <p>— Gjýseról (sé því bært við sem forefni glúkósa)</p>	<p>3 – 6 vikur eftir burð (kýr) ⁽⁶⁾ 6 vikur fyrir og 3 vikur eftir burð (ær) ⁽⁶⁾</p>	<p>3 – 10 vikur á þeim tíma sem grasvöxtur er mikill</p>	<p>Í notkunarlöbæiningum skulu vera upplýsingar um dagskammt, að því er varðar trefjæfni og orkugjafa sem eru auðveldlega tiltekið.</p> <p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkingu ef fóðrið er ætlað sauðfé: „Einkum fyrir mjólkandi ær.“</p> <p>Í notkunarlöbæiningum skulu koma fram upplýsingar um dagskammt, að því er varðar trefjæfni og auðgerjanlega kolvennisgjafa.</p> <p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkingu ef fóðrið er ætlað mjólkurkúmi: „Einkum fyrir nýttáær kýr.“</p>
<p>Að draga úr hættu á sturðoða ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾</p> <p>Að draga úr hættu á graskrampa (hypomagnesaemia)</p>	<p>Innihaldsefni sem eru orkugjafar í formi glúkósa</p> <p>Hátt magninnihald, kolvetni sem eru auðveldlega tiltekið, ríðlungs prótínnihald og lágt kalíurnnihald</p>	<p>Mjólkurkýr og ær</p> <p>Jörturkýr</p>	<p>— Sterkja — Heildarsýkurefni — Magníum — Natríum — Kalíum</p>	<p>3 – 10 vikur á þeim tíma sem grasvöxtur er mikill</p>	<p>Í notkunarlöbæiningum skulu koma fram upplýsingar um dagskammt, að því er varðar trefjæfni og orkugjafa sem eru auðveldlega tiltekið.</p> <p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkingu ef fóðrið er ætlað sauðfé: „Einkum fyrir mjólkandi ær.“</p> <p>Í notkunarlöbæiningum skulu koma fram upplýsingar um dagskammt, að því er varðar trefjæfni og auðgerjanlega kolvennisgjafa.</p> <p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkingu ef fóðrið er ætlað mjólkurkúmi: „Einkum fyrir nýttáær kýr.“</p>
<p>Að draga úr hættu á sturðoða</p>	<p>Lágt innihald auðgerjanlegra (auðmeltanlegra) kolvetna og hátt jafnarnagn</p>	<p>Jörturkýr</p>	<p>— Sterkja — Heildarsýkurefni</p>	<p>Hámark 2 mánuðir ⁽¹⁰⁾</p>	<p>Í notkunarlöbæiningum skulu koma fram upplýsingar um dagskammt, að því er varðar trefjæfni og auðgerjanlega kolvennisgjafa.</p> <p>Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkingu ef fóðrið er ætlað mjólkurkúmi: „Einkum fyrir nýttáær kýr.“</p>

1	2	3	4	5	6
Að koma vökva og rafkleyfum efnum í jafnvægi	Einkum rafkleyf efni og kolvetni sem eru auðveld til uppþöku	Kálfar Mjólkurgrísir Lömb Kjölingar Folöld	<ul style="list-style-type: none"> — Kolvetnisgjafi (kolvetnisgjafar) — Natrium — Kalíum — Klóríð 	1 – 7 dagar (1 – 3 dagar ef annað fóbúur er ekki gefið með)	<p>Upplýsingar á umböðum, fláti eða merkimiða ef fóbúur er ætlað jörturdýrum til að auka fallþunga þeirra.</p> <p>„Einkum fyrir alidýr.“⁽¹⁾</p> <p>Upplýsingar á umböðum, fláti eða merkimiða:</p> <p>— „Ef hættu er á meltingartruflunum (níðurgang), við meltingartruflunum og þar til bata er náð.“</p> <p>— „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir notkun.“</p>
Að draga úr myndun þvagsteina	Lágt innihald fosfórs, magníums og þvagstyringarefna	Jörturdýr	<ul style="list-style-type: none"> — Kalstium — Fosfór — Natríum — Magníum — Kalíum — Klóríð — Brennisteinn — Þvagstyringarefni Magníum 	Allt að 6 vikur	<p>Upplýsingar á umböðum, fláti eða merkimiða:</p> <p>„Einkum fyrir ung alidýr.“</p> <p>Upplýsingar í notkunarléibrenningum.</p> <p>„Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að vatni.“</p>
Að draga úr streituverkun	— Hátt magníuminnihald og/eða	Svín	<ul style="list-style-type: none"> — Auðmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á — Innihald n-3-fitusýra (sé þeim bæt við) 	1 – 7 dagar	<p>Veita skal léibþeiningar um hvemer notkun þessa fóbúrs er viðeigandi.</p>
Að koma hinni líffræðilegu meltingu í jafnvægi	— Lágt jafnamagn og auðmeltanleg innihaldsefni	Mjólkurgrísir	<ul style="list-style-type: none"> — Auðmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á — Jafnamagn — Uppruni þurrkandi efna (sé þeim bæt við) — Slímefnagjafar (sé slímefnum bæt við) 	2 – 4 vikur	<p>Upplýsingar á umböðum, fláti eða merkimiða:</p> <p>„Ef hættu er á meltingartruflunum, við meltingartruflunum og þar til bata er náð.“</p>

1	2	3	4	5	6
	— Auðmeltanleg innihaldsefni	Svín	— Auðmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á — Uppruni þurrkandi efna (sé þeim bæt við) — Slímefnagjafar (sé slímefnum bæt við)	10 – 14 dagar fyrir og 10 – 14 dagar eftir got	—
Að koma í veg fyrir hæðabreyfingu	Innihaldsefni sem örva hæðabreyfingu	Gyltur	Innihaldsefni sem örva hæðabreyfingu	Allt að 12 vikur	—
Að koma í veg fyrir fínuflurhækkenni (einkenni)	Lágt orkunnihald og hátt hlutfall niðurbjótanlegrar orku úr lípöðum með hátt innihald fjölmeltaðra fitusýra	Varphænur	— Orkugildi (reiknað út samkvæmt aðferðum EBE) — Hlutfall niðurbjótanlegrar orku úr lípöðum — Innihald fjölmeltaðra fitusýra	Tveir fyrstu vikurnar efir klak	—
Mótvægi við skort á uppsögi	Lágt innihald fjölmeltaðra fitusýra og hátt hlutfall fituleysanlegra vitarnna	Alifuglar, nema gæsir og dúfur	— Hlutfall fjölmeltaðra fitusýra með tilliti til heildarfitusýra — A-vitarnin samtals — D-vitarnin samtals — E-vitarnin samtals — K-vitarnin samtals	Allt að þrjú mánuðir	Veita skal leiðbeiningar um hvernær nokkun þessa fóburs er viðeigandi. Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita állits dýralæknis fyrir nokkun.“
Mótvægi við langvinnar truflanir í mjóggum	Auðmeltanleg kolvetni, prótín og flúa	Hestar	Auðmeltanlegir kolvetnis-, prótín- og fitugjafar og meðhöndlun þeirra ef við á	1 – 2 vikur	Veita skal leiðbeiningar um hvernær nokkun þessa fóburs er viðeigandi. Upplýsingar á umbjóðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita állits dýralæknis fyrir nokkun.“
Að draga úr hættu á metlungartruflunum í viðgírni	Hátt trefjainnihald, en auðmeltanleg innihaldsefni	Hestar	Auðmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á	—	—

1	2	3	4	5	6
<p>Að draga úr streituverkun</p> <p>Mótvægi við tap á rafkleyfum efnun sem verður þegar djúrið svtunar mikið</p>	<p>Auðmeltanleg innihaldsefni og hátt magniurninnihald</p> <p>Einkum rafkleyf efni og kolvetni sem eru auðveld til upptöku</p>	<p>Hestar</p> <p>Hestar</p>	<p>— Magníum — Auðmeltanleg innihaldsefni og meðhöndlun þeirra ef við á — Natríum — Kalíum — Klóríð — Glúkósi</p>	<p>2 – 4 vikur</p> <p>1 – 2 dagar</p>	<p>Veita skal leiðbeiningar um hvensær notkun þessa fóburs er viðeigandi.</p> <p>Upplýsingar í notkunarléð-beiningum: „Djúrið verður ávallt að hafa aðgang að vatni.“</p>

- 1) Framleiðanda er einnig heimilt að mæla með notkun í tengslum við útmáunndna nýrnabilun, ef við á.
- 2) Ef mælt er með fóbunni í tengslum við útmáunndna nýrnabilun skal útmáunndna nýrnabilun vera tvað til fjórar vikur.
- 3) Þegar um er að ræða fóbun fyrir ketni má bæta setningunni „þvagrásarheilkeni katta – F.U.S.“ (feline urological syndrome) við dálkinn Sérstök næringarmarkmið.
- 4) Þegar um er að ræða fóbun í tengslum við tiltekið óþol má tilfösum til tiltekna óþola korna í stað orðanna „innihaldsefnun og næringu“.
- 5) Framleiðanda er heimilt að bæta útvísuninni „skortur á framleiðslu brissafar“ við dálkinn Sérstök næringarmarkmið.
- 6) Heimilt er að nota hugtakið „ketóneitrun“ í staðinn fyrir „súrdósa“.
- 7) Framleiðanda er einnig heimilt að mæla með notkun í tengslum við beta eftir súrdósa.
- 8) Þegar um er að ræða fóbun fyrir mjólkurkyr.
- 9) Þegar um er að ræða fóbun fyrir ær.
- 10) Þegar um er að ræða fóbun fyrir mjólkurkyr: „Hámark tveir mánuðir frá því að mjólkurkeið hefst.“
- 11) Tilgreinið flokk jórurðýra.

4. gr.

Við lið 1.1 í VI. kafla A bætist nýr málslíður, svohljóðandi:

Innihaldi aukefni erfðabreyttar lífverur þá skal fara fram mat á umhverfisáhættu áður en því er sleppt af ásettu ráði út í umhverfið.

5. gr.

Í stað liðar 12.2 í VI. kafla D komi:
12.2 Ensím.

Viðskiptaheiti	Virk innihaldsefni(1)	Virknieining í g eða fjöldi gerlaklasaeininga í g	Aðili ábyrgur fyrir að setja vöru í umferð (nafn og heimilisfang)

(1) Fyrir örveirur: auðkenni stofnsins í samræmi við viðurkennt auðkenni aðþjóðlegs flokkunarkerfis ásamt geymslunúmeri stofnsins.

Fyrir ensím: Sérheiti í samræmi við ensímvirkni þeirra, auðkennisnúmer samkvæmt *International Union of Biochemistry* og ef þau eru af örverufræðilegum uppruna, auðkenni stofnsins í samræmi við viðurkennt auðkenni alþjóðlegs flokkunarkerfis ásamt geymslunúmeri stofnsins.

12.2.1. Ensím sem heimilt er að nota hér á landi.

Avizyme, óþynnt
Avizyme SX
Econan EGB
Porzyme SP, TP SF og SF100
Fytase (Natuphos 5000 og Natuphos 5000 L)

6. gr.

Við upptalningu efna í VI. kafla D bætist í viðeigandi töluliði:

- E 418 Gettan-gummí, aðeins í niðursoðnum dósamat fyrir hunda og ketti
E 161j Astaxanthin $C_{40}H_{52}O_4$, lax, silungur 100, aðeins heimilað í eldisfisk, sex mánaða og eldri
E 102 Tartrazine $C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$, skrautfiskar
E 110 Sunset Yellow FCF, $C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$, skrautfiskar
E 124 Ponceau 4 R, $C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$, skrautfiskar
E 127 Erythrosine $C_{20}H_6I_4O_5Na_2H_2O$, eitt sér eða í blöndu með Kantasantín
E 525 Kalíum hýdroxíð, fyrir hunda og ketti
E 526 Kalsíumhýdroxíð, fyrir hunda og ketti

EB-nr.	Aukaefni	Efnaformála- lýsing	Dýrategund- eða flokkur	Hámarks- aldur	Lágmarks- magn Heilfóður, mg/kg	Hámarks- magn	Önnur ákvæði
E563	Sepíólít- kenndur leir	Vatnað magn- íumsílikat úr botnfalls- efnum sem inniheldur að minnsta kosti 40% af sepíó- líti og 25% af illíti laust við asbest.	Allar dýra- tegundir- og flokkar	-	-	20.000	Allt fóður

7. gr.

Í töflu í B-lið VII. kafla reglugerðarinnar bætist eftirfarandi í töluð 1.1.:

Heilfóður fyrir fiska 4

8. gr.

Við upptalningu í XII. kafla reglugerðarinnar bætist:

Halofuginone	93/070/EBE
Robenidine	93/117/EB
Aflatoxin B ₁	94/014/EB

9. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 22 29. mars 1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytið, 28. desember 1995.

Guðmundur Bjarnason.

Jón Höskuldsson.

REGLUGERÐ

um leyfi afplánunarfanga til dvalar utan fangelsis.

1. KAFLI

Almenn ákvæði.

1. gr.

Forstöðumaður fangelsis getur veitt fanga sem afplánar refsingu og er skráður í því fangelsi, leyfi til dvalar utan fangelsis eftir reglum 2. kafla og 5. kafla.