leg við kröfur hér á landi að mati prófnefndar. Einnig sýni viðkomandi fram á að hann uppfylli skilyrði um endurmenntun skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 18/1997.

4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 6. mgr. 2. gr. laga nr. 18/1997, um endurskoðendur, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 26. júlí 2002.

F. h. r.

Baldur Guðlaugsson.

Telma Halldórsdóttir.

30. júlí 2002 Nr. 594

REGLUGERÐ

um (6.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 5. gr., B. lið, I. kafla bætast eftirfarandi orðskýringar:

Þéttbýlis-, húsa- og iðnaðarskólp:

1. „þéttbýlisskólp“: húsaskólp eða blanda húsaskólps og iðnaðarskólps og/eða afrennslisregnvatns;

2. „húsaskólp“: skólp frá íbúðarhúsnæði og þjónustustarfsemi sem einkum á rætur að rekja til efnaskipta mannslíkamans og til heimilisstarfa;

3. „iðnaðarskólp“: skólp frá húsnæði til verslunarreksturs eða iðnaðar annað en húsaskólp og afrennslisregnvatn;

Hreinn sjór: sjór eða sjóblandað vatn, sem ekki er mengað örverum, hættulegum efnum og/eða eitruðu sjávarsvifi að því marki að það geti spillt hollustu fiskafurða og sem er notað við þau skilyrði sem kveðið er á um í reglugerð nr. 233/1999, um hollustuhætti við meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafla og fiskafurða.

2. gr.

E. liður, 4. töluliðs um bönnuð hráefni, A. liðar, 2. viðauka, II. kafla orðast svo:

e) Allan úrgang frá aðskiljanlegum áföngum hreinsunarferlis þéttbýlis-, húsa- og iðnaðarskólps (Samanber orðskýringu í 5. gr. B. lið I. kafla) án tillits til frekari hreinsunar þessa úrgangs og uppruna skólpsins.

Hugtakið „skólp“ á ekki við um „vinnsluvatn“, þ.e. frárennsli í sérleiðslum í fyrirtækjum í matvæla- og fóðuriðnaði; vatn, sem er veitt í þessar leiðslur, skal vera heilnæmt og hreint (Eins og tilgreint er í reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn). Einnig er heimilt að veita hreinum sjó í leiðslur í fiskvinnslustöðvum (Samanber orðskýringu í 5. gr. B. liðar I. kafla). Vinnsluvatn skal einungis innihalda fóðurefni eða matvæli og skal vera tæknilega laust við hreinsiefni, sótthreinsandi efni eða önnur efni sem eru óheimil samkvæmt löggjöfinni um fóður.

Meðhöndla ber efni úr dýraríkinu í vinnsluvatninu í samræmi við D. lið 2. viðauka og reglugerð nr. 660/2000 um meðferð og nýtingu á sláturúrgangi og dýraúrgangi.

3. gr.

Eftirfarandi viðbætur og breytingar koma við 4., 12., og 13. tölulið, í D-hluta, 3. viðauka, II. kafla. Jafnframt bætist við nýr töluliður, 17. töluliður, við D-hluta, 3. viðauka, II. kafla. Í þennan flokk falla efni sem eru vaxtaraukandi.

a. Við 4. tölulið, hnislalyf í D-hluta, 3. viðauka, bætist og/eða breytist eftirfarandi:

EBE nr. og ESB gerð	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarksinnihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði
						Virkni einingar í milligrömmum á hvert kílógramm heilfóðurs		
E 766 937/2001/IV. viðauki	Intervet International bv	Natríumsalínómýsín 120 g/kg (Sacox 120)	*Samsetning aukefnis:* Natríumsalínómýsín ≤ 120 g/kg Kísildíoxíð: 10–100 g/kg Kalsíumkarbónat: 350–700 g/kg *Virkt efni:* Natríumsalínómýsín, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, CAS-númer: 53003-10-4 natríumsalt af pólýetramónó-karboxýlsýru sem er framleidd af *Streptomyces albus* (DSM 12217) Skyld óhreinindi: < 42 mg elaíófýlín/kg af natríumsalínó-mýsíni, < 40 g 17-epí-20-desoxý-salínómýsín/kg af natríum-salínómýsíni.	Eldis-kanínur	—	20	25	Notkun bönnuð í a.m.k. 5 daga fyrir slátrun. Í notkunarleið-beiningum komi fram: „Hættulegt hrossum.“ „Þetta fóður inniheldur aukefni úr jónófór-flokknum: óráðlegt er að nota það samtímis tilteknum lyfjum (t.d. tíamúlíni)“

EBE nr. og ESB gerð	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrgð á að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
						Virknieiningar í milligrömmum á kílógramm heilfóðurs		
E771 418/2001/ III. viðauki	Janssen Animal Health B.V.B.A	Díklasúríl 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5% forblanda)	**Samsetning aukefnis:** Díklasúríl: 0,5 g/100 g Sojamjöl: 99,25 g/100 g Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g Natríumhýdroxíð: 0,0538 g/100 g	Eldis-kalkúnar	12 vikur	1	1	Notkun bönnuð í a.m.k. fimm daga fyrir slátrun
		Díklasúríl 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% forblanda)	Díklasúríl: 0,2 g/100 g Sojabaunamjöl: 39,7 g/100 g Polyvidone K 30: 0,08 g/100 g Natríumhýdroxíð: 0,0215 g/100 g Hveitisáldmjöl: 60 g/100 g					
			Virkt efni: Díklasúríl, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klórfenýl[2,6-díklór-4-(2,3,4,5-tetrahýdró-3,5-díoxó-1,2,4-tríasín-2-ýl) fenýl] asetónítríl, CAS-númer: 101831-37-2, Skyld óhreinindi: Niðurbrotsefni (R064318): ≤ 0,2% Önnur skyld óhreinindi: (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5% hvert um sig Heildaróhreinindi ≤ 1,5%					

b. Við 12. tölulið, ensím (hvatar) í D-hluta, 3. viðauka bætist og/eða breytist eftirfarandi:

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virkni einingar á kílógramm heilfóðurs		
E 1600 418/2001/ I. viðauki	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Blanda af 3-fýtasa, framleidd með *Aspergillus niger* (CBS 114.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 5.000 FTU/g (1) Vökvaform: 5.000 FTU/ml	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	500 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500 FTU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,23% fýtínbundinn fosfór.
			Eldissvín	—	280 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 400-500 FTU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,23% fýtínbundinn fosfór.
			Gyltur	—	500 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500 FTU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,36% fýtínbundinn fosfór.

(1) 1 FTU er magn þess ensíms er leysir 1 míkrómól ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,5 og 37 °C

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs		
1353/ 2000/ I. viðauki			Eldis-kjúklingar	—	375 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 500-700 FTU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,23% fýtínbundinn fosfór.
			Varphænur	—	250 FTU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á kílógramm heilfóðurs: 300-400 FTU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,23% fýtínbundinn fosfór.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á hvert kílógramm heilfóðurs		
11 937/2001/ I. viðauki	Endó-1,4-beta-glúkanasi EC 3.2.1.4 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Blanda af endó-1,4-beta-glúkan-asa, endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddum með *Trichoderma longi-brachiatum* (ATCC 74 252), með virkni að lágmarki: Kyrnaform og fljótandi form: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 8.000 U ([1])/g eða ml Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 18.000 U ([2])/g eða ml Endó-1,4-beta-xýlanasi: 26.000 U ([3])/g eða ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 400 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1.300 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagðir skammtar á hvert kílógramm heilfóðurs: Endó-1,4-beta-glúkanasi: 400–1.600 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900–3.600 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1.300–5.200 U. 3. Til nota í fóðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum og beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda meira en 30% hveiti eða bygg og meira en 10% rúg.

(1) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 míkrómól glúkósa á mínútu úr karboxýmetýlsellulósa við pH 5,0 og 40 °C.
(2) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 míkrómól glúkósa á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 40 °C.
(3) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 0,1 míkrómól glúkósa á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,0 og 40 °C.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á hvert kílógramm heilfóðurs		
937/2001/ I. viðauki			Eldis-kalkúnar	—	Endó-1,4-beta-glúkanasi: 400 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1.300 U	— — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagðir skammtar á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-glúkanasi: 400–800 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 900–1.800 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 1.300–2.600 U. 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum og beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.
51 937/2001/ I. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Efnablanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), með virkni að lágmarki 100 IU ([4])/g	Mjólkur-grísir	2 mánuðir	10 IU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: 10 IU. 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af arabínoxýlani, t.d. þær sem innihalda yfir 40% hveiti.

(4) 1 IU er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birkiviði við pH 4,5 og 30 °C.

EBE nr. og ESB gerð.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks- innihald	Hámarks- innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs		
23 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Blanda af endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddur með *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10W), með virkni að lágmarki: Fast form: 70.000 IFP (1)/g Vökvaform: 7.000 IFP/ml	Eldis-kalkúnar	—	700 IFP	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: 1.400 IFP 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabín-oxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 40% hveiti
			Varphænur	—	840 IFP	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: 840 IFP 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum arabín-oxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 40% hveiti
27 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Blanda af endó-1,4-beta-xýlanasa, framleidd með *Trichoderma reesei* (CBS 529.94), og endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleidd með *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), með virkni að lágmarki: Fast form: 200.000 BXU (2)/g 200.000 BU (3)/g Vökvaform: 30.000 BXU/g 30.000 BU/g	Mjólkur-grísir	2 mánuðir	7.500 BXU 7.500 BU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: 7.500 til 15.000 BXU 7.500 til 15.000 BU 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýl-önum), t.d. þær sem innihalda meira en 50% hveiti

(1) 1 IFP er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr höfrum við pH 4,8 og 50 °C.
(2) 1 BXU er magn þess ensíms sem leysir 0,06 míkrómól afoxandi sykra (xýlósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birki við pH 5,3 og 50 °C.
(3) 1 BU er magn þess ensíms sem leysir 0,06 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 4,8 og 50 °C.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs		
28 418/2001/ II. viðauki	3-fýtasi EC 3.1.3.8	Blanda af 3-fýtasa, framleidd með *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), með virkni að lágmarki Fast form: 5.000 PPU ([4])/g Vökvaform: 1.000 PPU/g	Eldis-kjúklingar	—	500 PPU	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: 500 til 750 PPU. 3. Til nota í fóðurblöndur sem innihalda meira en 0,22% fýtínbundinn fosfór.
30 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8	Blanda af endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og endó-1,4-beta-xýlanasa, framleidd með *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), með virkni að lágmarki: Duftform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 2.000 U ([5])/g Endó-1,4-beta-xýlanasi: 1.400 U/g ([6])/g Vökvaform: Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 500 U/ml Endó-1,4-beta-xýlanasi: 350 U/ml	Eldis-kalkúnar	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U. 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 50% hveiti
			Varphænur	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U 3. Til nota í fóðurblöndur, auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 60% bygg eða 30% hveiti

(4) 1 PPU er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól ólífræns fosfats á mínútu úr natríumfýtati við pH 5,0 og 37 °C.
(5) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 5,55 míkrómól afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 50 °C.
(6) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 4,00 míkrómól afoxandi sykra (maltósajafngilda) á mínútu úr xýlani úr birkiviði við pH 5,5 og 50 °C.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs		
418/2001/ II. viðauki			Eldissvín	—	Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U Endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U	—	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 100 U endó-1,4-beta-xýlanasi: 70 U 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 50% bygg eða 60% hveiti
59 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6 Súbtilisín EC 3.4.21.62 Alfa-amýlasi EC 3.2.1.1 Fjölgalaktúronasi EC 3.2.1.15	Blanda af endó-1,4-beta-xýlanasa, framleiddum með *Trichoderma longibrachiatum* (ATTC 2105), endó-1,3(4)-beta-glúkanasa og alfa-amýlasa, framleiddum með *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), súbtilisíni, framleiddu með *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), fjölgalaktúronasa, framleiddum með *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U ([7])/g Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U ([8])/g Súbtilisín: 4.000 U ([9])/g Alfa-amýlasi: 400 U ([10])/g Fjölgalaktúronasi: 25 U ([11])/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U Súbtilisín: 4.000 U Alfa-amýlasi: 400 U Fjölgalakt-úronasi: 25 U	— — — — —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 300 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 150 U súbtilisín: 4.000 U alfa-amýlasi: 400 fjölgalaktúronasi: 25 U 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum, sterkju og öðrum en sterkju (einkum arabínoxýlönum og beta-glúkönum), t.d. þær sem innihalda meira en 40% maís.
60 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Blanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleidd með *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endó-1,3(4)-beta-glúkanasa, framleidd með *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), með virkni að lágmarki: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 5.000 U ([7])/g Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 50 U ([8])/g	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 U Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 5 U	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 500 til 2.500 U endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 5 til 25 U 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 20% bygg og 40% hveiti

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					Virknieiningar á kílógramm heilfóðurs		
61 418/2001/ II. viðauki	Endó-1,4-beta-xýlanasi EC 3.2.1.8 Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi EC 3.2.1.6	Blanda endó-1,4-beta-xýlanasa, framleidd með *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), með virkni að lágmarki: Duftform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 17.000 BXU ([2])/g Endó-1,3(4)-beta-xýlanasi: 11.000 BU ([3])/g Vökvaform: Endó-1,4-beta-xýlanasi: 22.000 U/ml Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 15.000 U/ml	Eldis-kjúklingar	—	Endó-1,4-beta-xýlanasi: 17.000 BXU Endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 11.000 BU	— —	1. Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. 2. Ráðlagður skammtur á hvert kílógramm heilfóðurs: endó-1,4-beta-xýlanasi: 17.000 BXU endó-1,3(4)-beta-glúkanasi: 11.000 BU 3. Til nota í fóðurblöndur auðugar af fjölsykrum öðrum en sterkju (einkum beta-glúkönum og arabínoxýlönum), t.d. þær sem innihalda meira en 40% bygg eða 55% hveiti.

(7) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (xýlósajafngidla) á mínútu úr xýlani úr hafrahismi við pH 5,3 og 50 °C.
(8) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi sykra (glúkósajafngilda) á mínútu úr beta-glúkani úr byggi við pH 5,0 og 30 °C.
(9) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól fenólsambands (týrósínjafngilda) á mínútu úr kaseínhvarfefni við pH 7,5 og 40 °C.
(10) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól glúkósíðtengja á mínútu úr vantsóleysanlegu, víxltengdu sterkjufjölliðuhvarfefni við pH 6,5 og 37 °C.
(11) 1 U er magn þess ensíms sem leysir 1 míkrómól afoxandi efnis (galaktúrónsýrujafngilda) á mínútu úr fjöl-D-galaktúrónhvarfefni við pH 5,0 og 40 °C.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-Aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					CFU/kg heilfóðurs		
E 1700 2437/2000/ I. viðauki	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) *Bacillus subtilis* (DSM 5750) (í hlutfallinu 1/1)	Blanda *Bacillus licheniformis* og *Bacillus subtilis* með lágmarks-aukefnisinnihald 3,2 × 10^9 CFU/g (1,6 × 10^9 CFU/g af hvorri bakteríu)	Mjólkur-grísir	2 mánuðir	1,28 × 10^9	3,2 × 10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun.

c. Við 13. tölulið, örverur í D-hluta, 3. viðauka bætist og/eða breytist eftirfarandi:

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarksinnihald	Önnur ákvæði
					CFU/kg heilfóðurs		
3 937/2001/ II viðauki	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Blanda af *Saccharomyces cerevisiae* sem inniheldur að lágmarki 5 × 10^9 CFU/g aukefnis	Mjólkurkýr	—	4 × 10^8	2 × 10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn *Saccharomyces cerevisiae* í dagskammti skal ekki fara yfir 5,6 × 10^9 CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. 8,75 × 10^9 CFU er bætt við á hver 100 kg lífþunga sem umfram eru.
5 937/2001/ II. viðauki	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	Blanda af *Saccharomyces cerevisiae* sem inniheldur að lágmarki 1 × 10^8 CFU/g aukefnis	Mjólkurkýr	—	5 × 10^7	3,5 × 10^8	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymsluþol og þol við kögglun. Magn *Saccharomyces cerevisiae* í dagskammti skal ekki fara yfir 1,2 × 10^9 CFU á hver 100 kg líkamsþyngdar. 1,7 × 10^8 CFU er bætt við á hver 100 kg lífþunga sem umfram eru.

EBE nr. og ESB gerð	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarks-aldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
					CFU/kg heilfóðurs		
20 418/2001/ I. viðauki	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (Í hlutfallinu 1/1)	Blanda *Bacillus licheniformis* og *Bacillus subtilis* sem inniheldur að lágmarki $3,2 \times 10^9$ CFU/g aukefnis ($1,6 \times 10^9$ CFU/g af hvorri bakteríu)	Kálfar	6 mánuðir	$1,28 \times 10^9$	$1,6 \times 10^9$	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymslu-þol og þol við kögglun.
21 418/2001/ I. viðauki	*Enterococcus faecium* DSM 3530	Blanda *Enterococcus faecium* sem inniheldur að lágmarki $2,5 \times 10^9$ CFU/g	Kálfar	6 mánuðir	1×10^9	1×10^9	Í notkunarleiðbeiningum með aukefninu og forblöndunni skal tilgreina geymsluhita, geymslu-þol og þol við kögglun.

d. Við D-hluta, 3. viðauka, bætist 17. töluliður. Eftirfarandi vaxtaraukandi efni falla í þennan flokk:

EBE nr. og ESB gerð	Nafn og skráningarnúmer þess sem ber ábyrð að setja aukefni í dreifingu	Aukefni (viðskiptaheiti)	Samsetning, efnaformúla, lýsing	Tegund eða flokkur dýra	Hámarksaldur	Lágmarks-innihald	Hámarks-innihald	Önnur ákvæði
						(millígrömm virks efnis á hvert kílógramm heilfóðurs)		
1 1334/2001/ I. viðauki	Norsk Hydro Ltd	Kalíumdíformat (Formi™ LHS)	Samsetning aukefnis: Kalíumdíformat, fast efni 98 g/100 g, Silíkat 1,5 g/100g, Vatn 0,5 g/100 g Virkt efni: Kalíumdíformat, fast efni $KH(COOH)_2$ CAS-númer 20642-05-1	Mjólkurgrísir	2 mánuðir	6.000	6.000	—
				Eldissvín	—	6.000	6.000	—

4. gr.

Reglugerð þessi tekur þegar gildi og er sett með stoð í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og með hliðsjón af eftirtöldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar nr. 1353/2000/EB, nr. 1887/2000/EB, nr. 2437/2000/EB, nr. 2697/2000/EB, nr. 418/2001/EB, nr. 937/2001/EB, nr. 1334/2001/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 285/2000/EB.

Landbúnaðarráðuneytinu, 30. júlí 2002.

Guðni Ágústsson.

Ólafur Friðriksson.

Nr. 595 30. júlí 2002

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir Velferðarsjóð barna á Íslandi.

1. gr.

Stofnaðild o.fl.

Velferðarsjóður barna á Íslandi, í skipulagsskrá þessari nefndur sjóðurinn, er stofnaður af Íslenskri erfðagreiningu ehf., kt. 691295-3549, Lynghálsi 1, Reykjavík og heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra fyrir hönd heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins, Laugavegi 116, Reykjavík. Hann starfar á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun, en mun ekki hafa með höndum atvinnurekstur.

2. gr.

Markmið.

Markmið með stofnun sjóðsins er að hlúa að hagsmunamálum og velferð barna á Íslandi, m.a. með framlögum til heilbrigðis-, velferðar- og menntamála, og samtaka og félaga á Íslandi sem hafa störf að velferð og lækningum barna á Íslandi sem aðaltilgang sinn. Markmiðum með stofnun sjóðsins skal náð með beinum fjárframlögum og styrkjum svo sem nánar greinir í skipulagsskrá þessari.

3. gr.

Stjórn sjóðsins.

Stjórn sjóðsins skal skipuð eftirtöldum þremur aðilum: Fulltrúa Íslenskrar erfðagreiningar ehf., fulltrúa heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra og fulltrúa atvinnulífsins, sem stofnaðilar tilnefna sameiginlega.

Láti stjórnarmaður af störfum skal varamaður hans taka sæti í stjórn. Skal hann þá tilnefna nýjan varamann í sinn stað.

Stjórnarmenn tilnefna hver um sig sinn varamann. Fulltrúi atvinnulífsins í stjórn sjóðsins skal við stofnun hans vera formaður sjóðsins en stjórnin skiptir að öðru leyti sjálf með sér verkum. Stjórnin skal skipuð formanni, gjaldkera og ritara. Formaður skal að jafnaði skipaður til þriggja ára í senn. Stjórninni er heimilt að skipta um formann sjóðsstjórnar